

Consulta Pública: CP nº 157/2016	Data de Publicação (DOU): 31/03/2016
Diretor (a) Relator: José Carlos Magalhães da Silva Moutinho	Prazo para recebimento de contribuições: 60 dias
Processo nº: 25351.343429/2015-56	Data de Encerramento: 06/06/2016
Agenda Regulatória: Subtema nº 16.1/2015-2016	Despacho de iniciativa: nº 102, de 09 de novembro de 2015.
Sigla da Área de origem: COFAR/GGMED	Regime de Tramitação: Comum
Ementa (assunto): Formulário Homeopático da Farmacopeia Brasileira, 1ª Edição.	

1. ANTECEDENTES SOBRE A PROPOSTA:

1.1 Justificativa, objetivos e contextualização

A Anvisa possui por competência legal promover a revisão e atualização periódica da Farmacopeia Brasileira, conforme disposto no inciso XIX do artigo 7º da Lei 9.782 de 26 de janeiro 1999. Esta competência compreende ações de regulamentação sanitária e indução ao desenvolvimento científico e tecnológico nacional que se concretizam por meio da revisão e incorporação de novos requisitos de qualidade nos compêndios e produtos da Farmacopeia Brasileira. O Formulário Homeopático da Farmacopeia Brasileira é um compêndio proposto pela Comissão da Farmacopeia Brasileira.

O Formulário Homeopático ora apresentado é um produto inédito na Farmacopeia Brasileira proposto pelo Comitê Técnico Temático de Homeopatia da Farmacopeia Brasileira (CTT HOM). Seu objetivo é suportar e fortalecer o sistema de notificação de medicamentos homeopáticos na Anvisa, e, fomentar o uso das Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (SUS) de forma a colaborar na implementação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – PNPIC (item 4.2. NA HOMEOPATIA da Portaria GM/MS Nº 971, de 03 de maio de 2006).

As aplicações previstas para o documento são a sua utilização: nas farmácias e nos laboratórios farmacêuticos industriais que preparam insumos homeopáticos e medicamentos homeopáticos; como referência para os prescritores habilitados na elaboração do receituário homeopático; pelos órgãos incumbidos da fiscalização visando garantir as boas práticas de manipulação e dispensação nas farmácias, de fabricação e controle nos laboratórios industriais e do receituário, no que diz respeito às clínicas homeopáticas; e no ensino da farmacotécnica homeopática nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde (3 FINALIDADES).

O formulário submetido à consulta pública constituiu-se por um texto inicial referente às finalidades do documento (FINALIDADES), pelas LISTAS DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE USO INTERNO e LISTAS DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE USO EXTERNO, pelas 86 (oitenta e seis) MONOGRAFIAS DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE USO INTERNO, e pelas 14 (quatorze) MONOGRAFIAS DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE USO INTERNO.

1.2 Resultados esperados

Suportar e fortalecer o sistema de notificação de medicamentos homeopáticos na Anvisa, e, fomentar o uso das Práticas Integrativas e Complementares no SUS de forma a colaborar na implementação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – PNPIC (item 4.2. NA HOMEOPATIA da Portaria GM/MS Nº 971, de 03 de maio de 2006).



2. ANÁLISE GERAL DAS CONTRIBUIÇÕES:

2.1 Análise quantitativa das contribuições recebidas

Avaliação	Número de contribuições recebidas	%
Inválidas (fora de escopo, prazo etc.)	109	11,1%
Válidas	874	88,9%

Avaliação	Número de contribuições válidas	%
Não aceito	519	59,4%
Aceito parcialmente	311	35,6%
Aceito	44	5,0%

Avaliação	Número de contribuições válidas	%
Concordo com a proposta	9	8,26%
Concordo parcialmente com a proposta	46	42,20%
Discordo integralmente da proposta	46	42,20%
Discordo da necessidade da regulamentação	8	7,34%

2.2 Destaques das alterações e aspectos mais relevantes da consulta pública e proposta final

Foram recebidas para a proposta submetida à Consulta Pública ao todo 983 contribuições realizadas por 109 contribuintes (Anexo I).

Houve um quantitativo elevado de contribuições semelhantes, dentre as quais se destacam:

1 – manifestações contra a proposta, em razão da seleção de dinâmizações, formas farmacêuticas, indicações e posologias (dentre as inúmeras possíveis na homeopatia), o que não consideraria a prática individualizada da homeopatia;

2 – solicitações para que a proposta incluísse informações sobre os profissionais prescritores;

3 – dúvidas sobre as finalidades do documento, como por exemplo, se a intenção da proposta era restringir a prática da homeopatia ao disposto no documento;

4 – solicitações para a exclusão dos itens indicações e posologia para que houvesse liberdade na prescrição;

5 – solicitações para inclusão de substâncias proscritas dinamizadas para que pudessem ser utilizadas no tratamento de dependentes químicos;

6 – solicitações para a inclusão de informações sobre a utilização, no caso de não haver melhora dos sintomas, por um prazo máximo de 15 dias, em razão do risco de ocorrência de patogênese.

Em resposta o CTT HOM elaborou um HISTÓRICO no qual informa que foi necessário reduzir as indicações e a farmacotécnica homeopática para viabilizar o seu aproveitamento na disponibilização de medicamentos no SUS e para o seu aproveitamento como referência no sistema de notificação de medicamentos homeopático da Anvisa, informando, ainda, que o documento não possui intenção restritiva à prática homeopática em geral. O CTT HOM elaborou também um capítulo de GENERALIDADES para esclarecer o propósito das monografias da proposta no qual foi adicionada a informação de que “não havendo evolução favorável, o paciente deve ser reavaliado pelo profissional habilitado”. Ainda, foi justificado que não

é objetivo da proposta regular os profissionais habilitados a prescrever e não é competência do documento dispor sobre o uso de substâncias proscritas.

Assim, após a Consulta Pública nº 157/2016 e análise das contribuições foram excluídas da proposta:

1 – a LISTA DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE USO EXTERNO e as 14 (quatorze) MONOGRAFIAS DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE USO EXTERNO; foram excluídas devido a Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos. Para a sua inclusão na próxima edição será necessário que o referido regulamento e a Farmacopeia Homeopática Brasileira estejam harmonizados quanto ao uso de tinturas-mãe em medicamentos homeopáticos; e

2 – as monografias *Cactus grandiflorus* 5CH e *Crataegus oxyacantha* 5 CH; em razão da reavaliação das monografias pelo CTT Homeopatia e decisão pela sua exclusão.

Também foram alteradas as dinamizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuição), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007.

Ressalta-se, ainda, que conforme descrito acima, foram acrescentados o capítulo HISTÓRICO e o capítulo GENERALIDADES com a finalidade de esclarecer para o público alvo o uso previsto do documento.

Finalizando, além das alterações destacadas acima, foram feitas correções de informações e aprimoramento da descrição das indicações.

3. CONSOLIDAÇÃO DA ANÁLISE DE CONTRIBUIÇÕES EM CONSULTA PÚBLICA:

CONTRIBUIÇÃO Nº 01 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>3 FINALIDADES</p> <p>A Comissão da Farmacopeia Brasileira aprova o Formulário Homeopático da Farmacopeia Brasileira 1ª edição para as aplicações a seguir.</p> <p>1 Nas farmácias e nos laboratórios farmacêuticos industriais que preparam insumos homeopáticos e medicamentos homeopáticos.</p> <p>2 Pelos prescritores habilitados na elaboração do receituário homeopático.</p> <p>3 Pelos órgãos incumbidos da fiscalização visando garantir as boas práticas de manipulação e dispensação nas farmácias, de fabricação e controle nos laboratórios industriais e do receituário, no que diz respeito às clínicas homeopáticas.</p> <p>4 No ensino da farmacotécnica homeopática nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde.</p>	<p>Não alterado.</p>	<p><input type="checkbox"/> Incluído</p> <p><input type="checkbox"/> Excluído</p> <p><input type="checkbox"/> Nova Redação</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nenhuma contribuição incorporada</p> <p><input type="checkbox"/> Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: não é objetivo da proposta regular os profissionais habilitados a prescrever.</p>		
CONTRIBUIÇÃO Nº 02 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições

4 MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE USO INTERNO.

1 Aconitum napellus 6 CH	27 Carduus marianus 6 CH	1 Aconitum napellus 6 CH	() Incluído
2 Actaea racemosa 6 CH	28 Causticum 6 CH	2 Actaea racemosa 6 CH	() Excluído
3 Aescullus hippocastanum 3 CH	29 Chamomilla 6 CH	3 Aescullus hippocastanum <u>36</u> CH	(x) Nova Redação
4 Allium cepa 5 CH	30 Chelidonium majus 6 CH	4 Allium cepa <u>56</u> CH	() Nenhuma
5 Allium sativum	31 China officinalis 5 CH	5 Allium sativum <u>6CH</u>	contribuição
6 Alumina 30 CH	32 Cocculus indicus 5 CH	6 Alumina <u>306</u> CH	incorporada
7 Anacardium orientale 6 CH	33 Coffea cruda 12 CH	7 Anacardium orientale 6 CH	() Sem
8 Antimonium crudum 6 CH	34 Colocynthis 5 CH	8 Antimonium crudum 6 CH	contribuição
9 Antimonium tartaricum 12 CH	35 Conium maculatum 12 CH	9 Antimonium tartaricum <u>126</u> CH	
10 Apis mellifica 5 CH	36 Crataegus oxyacantha 5 CH	10 Apis mellifica <u>56</u> CH	
11 Argentum nitricum 6 CH	37 Drosera rotundifolia 5 CH	11 Argentum nitricum 6 CH	
12 Arnica Montana 6 CH	38 Dulcamara 6 CH	12 Arnica <u>Montana montana</u> 6 CH	
13 Arsenicum álbum 6 CH	39 Eupatorium perfoliatum 5 CH	13 Arsenicum <u>album album</u> 6 CH	
14 Avena sativa 3 DH	40 Ferrum metallicum 6 CH	14 Avena sativa 3 DH	
15 Baryta carbônica 5 CH	41 Ferrum phosphoricum 6 CH	15 Baryta <u>carbônica 5carbonica</u> 6 CH	
16 Belladonna 6 CH	42 Gelsemium sempervirens 6 CH	16 Belladonna 6 CH	
17 Berberis vulgaris 5 CH	43 Graphites 6 CH	17 Berberis vulgaris <u>56</u> CH	
18 Borax 6 CH	44 Hamamelis virginica 6 CH	18 Borax 6 CH	
19 Bryonia Alba 12 CH	45 Hepar sulfuris 6 CH	19 Bryonia <u>Alba alba</u> <u>126</u> CH	
20 Cactus grandiflorus 5 CH	46 Hydrastis canadensis 6 CH	20 <u>Cactus grandiflorus 5Calcarea carbonica</u> 6 CH	
21 Calcarea carbônica 6 CH	47 Hypericum perforatum 6 CH	21 Calcarea <u>carbônicafluorica</u> 6 CH	
22 Calcarea fluorica 6 CH	48 Ignatia amara 30 CH	22 Calcarea <u>fluoricaphosphorica</u> 6 CH	
23 Calcarea phosphorica 6 CH	49 Ipecacuanha 5 CH	23 <u>Calcarea phosphoricaCalendula officinalis</u> 6 CH	
24 Calendula officinalis 6 CH	50 Iris vesicolor 6 CH	24 <u>Calendula officinalisCantharis vesicatoria</u> 6 CH	
25 Cantharis vesicatoria 6 CH	51 Kali bichromicum 6 CH	25 <u>Cantharis vesicatoriaCarbo vegetabilis</u> 6 CH	
26 Carbo vegetabilis 6 CH	52 Kalium phosphoricum 6 CH	26 <u>Carbo vegetabilisCarduus marianus</u> 6 CH	
53 Lachesis muta 6 CH	70 Rhus toxicodendron 6 CH	27 <u>Carduus marianusCausticum</u> 6 CH	
54 Ledum palustre 5 CH	71 Rumex crispus 6 CH	28 <u>GausticumChamomilla</u> 6 CH	
55 Lemna minor 5 CH	72 Ruta graveolens 6 CH	29 <u>ChamomillaChelidonium majus</u> 6 CH	
56 Lobelia inflata 5 CH	73 Sabadilla officinarum 6 CH	30 <u>Chelidonium majusChina officinalis</u> 6 CH	
57 Lycopodium clavatum 6 CH	74 Sambucus nigra 6 CH	31 <u>China officinalis 5Cocculus indicus</u> 6 CH	
58 Magnesium phosphoricum 6 CH	75 Sanguinaria canadensis 6 CH	32 <u>Cocculus indicus 5Coffea cruda</u> 6 CH	
59 Mercurius solubilis 6 CH	76 Sepia succus 6 CH	33 <u>Coffea cruda 12Colocynthis</u> 6 CH	
60 Myristica sebifera 6 CH	77 Silicia 6 CH	34 <u>Colocynthis 5Conium maculatum</u> 6 CH	
61 Natrium muriaticum 6 CH	78 Spongia tosta 5 CH	35 <u>Conium maculatum 12Drosera rotundifolia</u> 5 CH	
62 Nux vômica 6 CH	79 Staphysagria 6 CH	36 <u>Crataegus oxyacantha 5Dulcamara</u> 6 CH	
63 Passiflora incarnata 5 CH	80 Sticta pulmonária 6 CH	37 <u>Drosera rotundifoliaEupatorium perfoliatum</u> 5 CH	
64 Petroleum 6 CH	81 Sulphur 6 CH	38 <u>DulcamaraFerrum metallicum</u> 6 CH	
65 Phosphorus 12 CH	82 Symphytum officinale 6 CH	39 <u>Eupatorium perfoliatum 5Ferrum phosphoricum</u> 6 CH	
66 Phytolacca decandra 5 CH	83 Thuya occidentalis 6 CH	40 <u>Ferrum metallicumGelsemium sempervirens</u> 6 CH	
67 Plantago major 5 CH	84 Valeriana officinalis 5 CH	41 <u>Ferrum phosphoricumGraphites</u> 6 CH	
68 Podophyllum 5 CH	85 Veratum álbum 6 CH	42 <u>Gelsemium sempervirensHamamelis virginiana</u> 6 CH	
69 Pulsatilla nigricans 6 CH	86 Zincum metallicum 12 CH	43 <u>GraphitesHepar sulfuris</u> 6 CH	
		44 <u>Hamamelis virginicaHydrastis canadensis</u> 6 CH	
		45 <u>Hepar sulfurisHypericum perforatum</u> 6 CH	
		46 <u>Hydrastis canadensisIgnatia amara</u> 6 CH	
		47 <u>Hypericum perforatum 6Ipecacuanha</u> 5 CH	
		48 <u>Ignatia amara 30Iris vesicolor</u> 6 CH	

	<p>49 Ipecacuanha <u>Kali bichromicum</u> 6 CH 50 Iris vesicaria <u>Kalium phosphoricum</u> 6 CH 51 Kali bichromicum <u>Lachesis muta</u> 6 CH 52 Kalium phosphoricum <u>Ledum palustre</u> 5 CH 53 Lachesis muta <u>Lemna minor</u> 5 CH 54 Ledum palustre <u>Lobelia inflata</u> 5 CH 55 Lemna minor <u>Lycopodium clavatum</u> 6 CH 56 Lobelia inflata <u>Magnesium phosphoricum</u> 6 CH 57 Lycopodium clavatum <u>Mercurius solubilis</u> 6 CH 58 Magnesium phosphoricum <u>Myristica sebifera</u> 6 CH 59 Mercurius solubilis <u>Natrium muriaticum</u> 6 CH 60 Myristica sebifera <u>Nux vômica</u> 6 CH 61 Natrium muriaticum <u>Passiflora incarnata</u> 5 CH 62 Nux vômica <u>Petroleum</u> 6 CH 63 Passiflora incarnata <u>Phosphorus</u> 6 CH 64 Petroleum <u>Phytolacca decandra</u> 6 CH 65 Phosphorus <u>Plantago major</u> 6 CH 66 Phytolacca decandra <u>Podophylum</u> 6 CH 67 Plantago major <u>Pulsatilla nigricans</u> 6 CH 68 Podophylum <u>Rhus toxicodendron</u> 6 CH 69 Pulsatilla nigricans <u>Rumex crispus</u> 6 CH 70 Rhus toxicodendron <u>Ruta graveolens</u> 6 CH 71 Rumex crispus <u>Sabadilla officinarum</u> 6 CH 72 Ruta graveolens <u>Sambucus nigra</u> 6 CH 73 Sabadilla officinarum <u>Sanguinaria canadensis</u> 6 CH 74 Sambucus nigra <u>Sepia succus</u> 6 CH 75 Sanguinaria canadensis <u>Silicia</u> 6 CH 76 Sepia succus <u>Spongia tosta</u> 5 CH 77 Silicia <u>Staphysagria</u> 6 CH 78 Spongia tosta <u>Sticta pulmonária</u> 6 CH 79 Staphysagria <u>Sulphur</u> 6 CH 80 Sticta pulmonária <u>Symphytum officinale</u> 6 CH 81 Sulphur <u>Thuja occidentalis</u> 6 CH 82 Symphytum officinale <u>Valeriana officinalis</u> 5 CH 83 Thuja occidentalis <u>Veratum album</u> 6 CH 84 Valeriana officinalis <u>Zincum metallicum</u> 6 CH 85 Veratum album 6 CH 86 Zincum metallicum 12 CH</p>	
--	---	--

Justificativa: foram feitas correções de informações e alteradas as dinâmizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007.

CONTRIBUIÇÃO Nº 03 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)

Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>5 MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS DE USO EXTERNO.</p> <p>87 Aescullus hippocastanum TM 94 Hamamelis virginiana TM 88 Apis mellifica 6 CH 95 Lappa major TM 89 Arnica Montana TM 96 Ledum palustre TM</p>	<p>Excluído.</p>	<p>() Incluído (x) Excluído () Nova Redação () Nenhuma contribuição</p>

90 Belladonna TM 91 Calendula officinalis TM 92 Chamomilla TM 93 Cyrtopodium punctatum TM	97 Paeonia officinalis TM 98 Ratanhia TM 99 Symphytum officinale TM 100 Thuya occidentalis TM		incorporada () Sem contribuição
Justificativa: foram excluídas porque a Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prevê o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos. Para a sua inclusão na próxima edição será necessário que o referido regulamento e a Farmacopeia Homeopática Brasileira estejam harmonizados quanto ao uso de tinturas-mãe em medicamentos homeopáticos.			
CONTRIBUIÇÃO Nº 04 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)			
Texto submetido à consulta pública		Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	
Aconitum napellus 6 CH			
<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: dor aguda intensa nos ouvidos de aparecimento brusco; febre alta; todas estas indicações geralmente ocasionadas pelo frio seco.</p> <p>REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 1. São Paulo: Robe Editorial, 2003. HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003. LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Organon, 2004.</p>		<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: dor aguda intensa nos ouvidos de aparecimento <u>bruscoprepentino, com tímpano vermelho</u>; febre alta; <u>todas agitação; estas indicações geralmente ocasionadas pelo frio seco intenso e brusco e com início ou agravamento à noite.</u></p> <p>REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 1. São Paulo: Robe Editorial, 2003. <u>DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009.</u> HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003. <u>KAYNE, S. B.: KAYNE, L. R. Homeopathic Prescribing. London: Pharmaceutical Press, 2007.</u> LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Organon, 2004.</p>	
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.			
CONTRIBUIÇÃO Nº 05 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)			
Texto submetido à consulta pública		Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	
Actaea racemosa 6 CH			
<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: contraturas musculares, principalmente na região dorsal e cervical devido à má postura; dores reumáticas principalmente no período menstrual e da menopausa, cólica menstrual que piora quanto mais intenso for o fluxo.</p> <p>REFERÊNCIAS DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009. HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003. LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Organon, 2004.</p>		<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: contraturas musculares, principalmente na região dorsal e cervical devido à má postura; dores reumáticas principalmente no período menstrual e da menopausa, cólica menstrual que piora quanto mais intenso for o fluxo. <u>De modo geral, piora pelo frio e umidade, e melhora pelo calor, exceto a cabeça, que melhora pelo frio.</u></p> <p>Posologia sugerida: cinco gotas ou cinco glóbulos ou três tabletes ou comprimido quatro vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p> <p>REFERÊNCIAS DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009. HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003. <u>KAYNE, S. B.: KAYNE, L. R. Homeopathic Prescribing. London: Pharmaceutical Press, 2007.</u></p>	

	LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática . 2. ed. São Paulo: Organon, 2004.	
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 06 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Aesculus hippocastanum 3 CH</p> <p>Orientações para o preparo.</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 65% (v/v) a partir da Aesculus hippocastanum 2 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Tabletes e comprimidos. Preparar a partir da Aesculus hippocastanum 3 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: varizes e hemorroidas pruriginosas.</p> <p>Posologia sugerida: cinco gotas ou três tabletes ou um comprimido quatro vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p> <p>REFERÊNCIAS DEMARQUE, D. <i>et al.</i> Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009. HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003. LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Organon, 2004.</p>	<p>Aesculus hippocastanum 36 CH</p> <p>Orientações para o preparo:</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 6530% (v/v) a partir dedo Aesculus hippocastanum 25 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes e comprimidos</p> <p>Tabletes e comprimidos. Preparar a partir dedo Aesculus hippocastanum 36 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: varizes e hemorroidas pruriginosas. <u>Melhora pelo frio e exercício moderado e prolongado. Piora pelo calor, estando em pé, durante o sono e ao acordar.</u></p> <p>Posologia sugerida: cinco gotas ou <u>cinco glóbulos ou</u> três tabletes ou um comprimido quatro vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p> <p>REFERÊNCIAS DEMARQUE, D. <i>et al.</i> Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009. HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003. <u>KAYNE, S. B.; KAYNE, L. R. Homeopathic Prescribing. London: Pharmaceutical Press, 2007.</u> LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Organon, 2004.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 07 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Allium cepa 5 CH</p> <p>Orientações para o preparo.</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 30% a partir do Allium cepa 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes e comprimidos. Preparar a partir da Allium cepa 5 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p>	<p>Allium cepa 56 CH</p> <p>Orientações para o preparo:</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 30% <u>(v/v)</u> a partir do Allium cepa 45 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir da Allium cepa 56 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>

<p>Indicações: rinite com coriza aquosa abundante e irritante, e lacrimejamento abundante não irritante.</p> <p>REFERÊNCIAS DEMARQUE, D. <i>et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática</i>. São Paulo: Organon, 2009. HORVILLEUR, A. <i>Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia</i>. São Paulo: Andrei, 2003. LATHOUD, F. <i>Estudos de Matéria Médica Homeopática</i>. 2. ed. São Paulo: Organon, 2004.</p>	<p>g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: rinite com coriza aquosa abundante e irritante, e lacrimejamento abundante não irritante. Melhora pelo frio e ao ar livre, exceto se contém alérgenos. Piora pelo calor ou em ambiente quente.</p> <p>REFERÊNCIAS DEMARQUE, D. <i>et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática</i>. São Paulo: Organon, 2009. HORVILLEUR, A. <i>Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia</i>. São Paulo: Andrei, 2003. KAYNE, S. B.; KAYNE, L. R. Homeopathic Prescribing. London: Pharmaceutical Press, 2007. LATHOUD, F. <i>Estudos de Matéria Médica Homeopática</i>. 2. ed. São Paulo: Organon, 2004.</p>	
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 08 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Allium sativum 6 CH Orientações para o preparo: Gotas Preparar em etanol a 30% a partir do Allium sativum 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: sintomas das gripes e resfriados com ou sem febre. Dores articulares e musculares relacionadas ao resfriado. Bronquite. Dispepsia.</p>	<p>Orientações para o preparo: Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Allium sativum 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: sintomas das gripes e resfriados com ou sem febre. Coriza com tosse seca ou produtiva. Dores articulares e musculares relacionadas ao resfriado. Bronquite. Dispepsia.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 09 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Alumina 30 CH Orientações para o preparo. Gotas Preparar em etanol a 30% a partir do Alumina 29 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos. Preparar a partir da Alumina 30 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: prisão de ventre sem vontade de evacuar com fezes ressecadas; com dor ao evacuar. Posologia sugerida: cinco gotas ou cinco glóbulos ou três tabletes ou um comprimido à noite. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas. REFERÊNCIAS DEMARQUE, D. <i>et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática</i>. São Paulo: Organon, 2009. HORVILLEUR, A. <i>Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia</i>. São Paulo: Andrei, 2003. LATHOUD, F. <i>Estudos de Matéria Médica Homeopática</i>. 2. ed. São Paulo: Organon, 2004.</p>	<p>Alumina 30 CH Orientações para o preparo: Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Alumina 29 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir da Alumina 30 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: prisão de ventre constipação intestinal por inércia retal sem vontade de evacuar com fezes ressecadas; com dor ao evacuar. Posologia sugerida: cinco gotas ou cinco glóbulos ou três tabletes ou um comprimido à noite duas vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas. REFERÊNCIAS</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>

	<p>DEMARQUE, D. <i>et al.</i> Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009.</p> <p>HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003.</p> <p>KAYNE, S. B.: KAYNE, L. R. Homeopathic Prescribing. London: Pharmaceutical Press, 2007.</p> <p>LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Organon, 2004.</p>	
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Também foram alteradas as dinâmizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 e foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 10 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Anacardium orientale 6 CH</p> <p>Nome Homeopático: Anacardium orientale.</p> <p>Sinonímia Homeopática: Semecarpus anacardium; S. cuneifolia; S. latifolia; S. mangifera; Anacardium; Anacardium latifolium; A. longifolium; A. officinale; A. officinarum; A. solitarium; A. tomentosa e Avicennia tomentosa.</p> <p>Orientações para o preparo.</p> <p>Gotas</p> <p>Preparar em etanol a 30% a partir do Anacardium orientale 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: dispepsias e Gastralgias de origem nervosa melhoradas ao se alimentar.</p> <p>Posologia sugerida: cinco gotas ou cinco glóbulos ou três tabletes ou um comprimido quatro vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p>	<p>Nome Homeopático: Anacardium orientale.</p> <p>Sinonímia Homeopática: Semecarpus anacardium; S. cuneifoliacuneifolia; S. latifolialatifolia; S. mangifera; Anacardium; Anacardium latifolium; A. longifolium; A. officinale; A. officinarum; A. solitarium; A. tomentosa e Avicennia tomentosa.</p> <p>Orientações para o preparo:</p> <p>Gotas</p> <p>Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Anacardium orientale 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: dispepsias e Gastralgias de origem nervosa melhoradas ao se alimentar. Piora pelo trabalho intelectual e no momento em que o estômago está vazio. Tratamento adjuvante da dor causada por úlceras gastroduodenais.</p>	<p>() Incluído</p> <p>() Excluído</p> <p>(x) Nova Redação</p> <p>() Nenhuma contribuição incorporada</p> <p>() Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 11 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Antimonium crudum 6 CH</p> <p>Gotas</p> <p>Preparar em etanol a 30% a partir do Antimonium crudum 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: dispepsia por excessos alimentares com a língua saburrosa esbranquiçada.</p>	<p>Gotas</p> <p>Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Antimonium crudum 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: dispepsia por excessos alimentares com a língua saburrosa esbranquiçada e diarreias relacionadas às intolerâncias alimentares. Piora pelos excessos alimentares e refeições ácidas.</p>	<p>() Incluído</p> <p>() Excluído</p> <p>(x) Nova Redação</p> <p>() Nenhuma contribuição incorporada</p> <p>() Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 12 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>

		contribuições
Antimonium tartaricum 12 CH	Antimonium tartaricum 126 CH	() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição
<p>Sinonímia Homeopática: Antimonii et potassi tartras; Emeticus; Kalii antimoniotartras; Kalii et stibii tartras; Kali-stibico tartaricum; stibii et kalii tartras; Stibiokali tartaricum; Tartarus animoniatus; Taratarus emeticus; Tartarus stibiatus e Tartras potassi et antimonii.</p> <p>Orientações para o preparo.</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 30% a partir do Antimonium tartaricum 11 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes e comprimidos. Preparar a partir da Antimonium tartaricum 12 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: tosse com grande acúmulo de muco nas vias respiratórias de difícil expectoração.</p>	<p>Sinonímia Homeopática: Antimonii et potassi tartras; Emeticus; Kalii antimoniotartras; Kalii et stibii tartras; Kali-stibico tartaricum; stibii et kalii tartras; Stibiokali tartaricum; Tartarus animoniatus; TaratarusTartarus emeticus; Tartarus stibiatus e Tartras potassi et antimonii.</p> <p>Orientações para o preparo:</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Antimonium tartaricum 115 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir da Antimonium tartaricum 126 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: tosse com grande acúmulo de muco nas vias respiratórias de difícil expectoração. Respiração difícil e ruidosa acompanhada de sonolência, abatimento e palidez. Melhora pelas expectorações e na posição sentada piora pelo calor e estar deitado.</p>	
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Também foram alteradas as dinamizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 e foram feitas correções de informações.</p>		
CONTRIBUIÇÃO Nº 13 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Apis mellifica 5 CH	Apis mellifica 56 CH	() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição
<p>Nome Homeopático: Apis mellifica.</p> <p>Orientações para o preparo.</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 30% a partir do Apis mellifera 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes e comprimidos. Preparar a partir da Apis mellifica 5 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p>	<p>Nome Homeopático: Apis mellificamellifica.</p> <p>Orientações para o preparo:</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Apis mellifera-4mellifica 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir da Apis mellifica 56 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p>	
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
CONTRIBUIÇÃO Nº 14 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Argentum nitricum 6 CH	Gotas	() Incluído

<p>Gotas Preparar em etanol a 30% a partir do Argentum nitricum 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: dores intensas e queimantes no estômago após refeição; diarreia esverdeada, acompanhada de gases barulhentos; ansiedade com medo de realizar algo.</p>	<p>Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Argentum nitricum 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: gastrite, refluxo gastroesofágico e úlceras gastroduodenais com dores intensas e queimantes no estômago após refeição; diarreia esverdeada, acompanhada de gases barulhentos; ansiedade com medo de realizar algo; Melhora pelo frio, ar livre e fresco e pela pressão na região dolorosa. Piora geral pelo calor (exceto as gastralgias), durante as menstruações e pelos doces (gastralgias, distensão e diarreia).</p>	<p>() Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 15 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Arnica montana 6 CH Gotas Preparar com álcool a 30%, a partir da Arnica montana 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: contusões, dores musculares causadas por excessos de exercícios; traumatismos mecânicos; dor com sensação de contusão; feridas cirúrgicas.</p>	<p>Gotas Preparar com álcool a 30% (v/v), a partir da Arnica montana 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: contusões, dores musculares causadas por excessos de exercícios; traumatismos mecânicos; dor com sensação de contusão; feridas cirúrgicas. Melhora pelo repouso e deitado com a cabeça baixa. Piora pelo mais leve toque, pelos sobressaltos, movimento e pelo frio úmido.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 16 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Arsenicum album 6 CH Orientações para o preparo: Gotas Preparar, com etanol a 30%, a partir da Arsenicum album 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: gastroenterites agudas, febris ou não, com fezes queimantes e escoriantes, náuseas abundantes e que acometem o estado geral; intoxicações alimentares.</p>	<p>Orientações para o preparo: Gotas Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Arsenicum album 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: gastroenterites agudas, febris ou não, com fezes queimantes e escoriantes e fétidas, náuseas abundantes e que acometem o estado geral; intoxicações alimentares. Melhora pelo calor, sob todas as suas formas (aplicações quentes, ambiente, bebidas ou alimentos quentes) e pela mudança de lugar ou posição. Piora entre 1 e 3 horas da manhã e pelo frio (exceto as cefaleias e a congestão cefálica).</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 17 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		

Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Avena sativa 3 DH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).	Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).	<input type="checkbox"/> Incluído <input type="checkbox"/> Excluído <input checked="" type="checkbox"/> Nova Redação <input type="checkbox"/> Nenhuma contribuição incorporada <input type="checkbox"/> Sem contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 18 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Baryta carbônica 5 CH Nome Homeopático: Baryta carbônica Orientações para o preparo. Gotas Preparar, com etanol a 30%, a partir da Baryta carbonica 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos. Preparar a partir da Baryta carbonica 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: hipertrofia das amígdalas; prevenção das amigdalites recidivantes. Referências bibliográficas: BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 1. São Paulo: Robe Editorial, 2003. Sanitária, 2011. BRASIL. Farmacopeia Homeopática Brasileira. 3. ed., Brasília, DF: Agência Nacional de Vigilância CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. DEMARQUE, D. <i>et al.</i> Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009. VANNIER, L.; POIRIER, J. Précis de matière médicale homéopathique. Paris: Doin, 1985.	Baryta carbônica 5 carbônica 6 CH Nome Homeopático: Baryta carbônica carbônica Orientações para o preparo: Gotas Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Baryta carbonica 45 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir da Baryta carbonica 56 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: hipertrofia das amígdalas amígdalas e adenoides; prevenção das amigdalites amigdalites recidivantes. <u>Piora pela umidade e pelo menor resfriamento, que pode provocar amidalite ou hipertrofia ganglionar.</u> REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 1. São Paulo: Robe Editorial, 2003. Sanitária, 2011. BRASIL. Farmacopeia Homeopática Brasileira. 3. ed., Brasília, DF: Agência Nacional de Vigilância CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. DEMARQUE, D. <i>et al.</i> Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009. VANNIER, L.; POIRIER, J. Précis de matière médicale homéopathique. Paris: Doin, 1985. <u>VOISIN, H. Manual de Matéria Médica para o Clínico. 2. ed. São Paulo: Andrei, 1984.</u>	<input type="checkbox"/> Incluído <input type="checkbox"/> Excluído <input checked="" type="checkbox"/> Nova Redação <input type="checkbox"/> Nenhuma contribuição incorporada <input type="checkbox"/> Sem contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 19 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da

	alteração)	análise das contribuições
Belladonna 6 CH Nome Homeopático: Belladonna. Sinonímia Homeopática: Atropa beladonna; Solanum furiosum e Belladonna bacífera. Orientações para o preparo. Gotas Preparar, com etanol a 30%, a partir da Belladonna 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: febre aguda de instalação rápida (rosto vermelho, secura das mucosas, calor radiante, transpiração intensa); processos inflamatórios com congestão local (tumor, rubor, calor, dor).	Belladonna 6 CH Nome Homeopático: <u>Belladonna</u> <u>Belladonna</u> . Sinonímia Homeopática: Atropa <u>beladonna</u> <u>belladonna</u> ; Solanum furiosum e Belladonna bacífera. Orientações para o preparo: Gotas Preparar, com etanol a 30% <u>(v/v)</u> , a partir da Belladonna 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: febre <u>aguda</u> <u>alta e</u> de instalação rápida (rosto vermelho, secura das mucosas, calor radiante, transpiração intensa); processos inflamatórios com congestão local (tumor, rubor, calor, dor). <u>Dores pulsáteis. Melhora pelo repouso. Piora pela luz intensa, pelo ruído, pelo toque e sobressaltos, pelo ar frio, pelo calor na cabeça.</u>	<input type="checkbox"/> Incluído <input type="checkbox"/> Excluído <input checked="" type="checkbox"/> Nova Redação <input type="checkbox"/> Nenhuma contribuição incorporada <input type="checkbox"/> Sem contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 20 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Berberis vulgaris 5 CH Orientações para o preparo. Gotas Preparar, com etanol a 30%, a partir da Berberis vulgaris 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir da Berberis vulgaris 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: cólica renal com dor na região lombar que irradia ao ureter principalmente à esquerda; cólica hepática que irradia para todo o abdômen.	Berberis vulgaris <u>56</u> CH Orientações para o preparo: Gotas Preparar, com etanol a 30% <u>(v/v)</u> , a partir da Berberis vulgaris <u>45</u> CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir da Berberis vulgaris <u>56</u> CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: cólica renal com dor <u>contusa</u> na região lombar que irradia ao ureter, principalmente à esquerda, <u>a bexiga</u> ; cólica hepática que irradia para todo o abdômen.	<input type="checkbox"/> Incluído <input type="checkbox"/> Excluído <input checked="" type="checkbox"/> Nova Redação <input type="checkbox"/> Nenhuma contribuição incorporada <input type="checkbox"/> Sem contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Também foram alteradas as dinâmizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 e foram feitas correções de informações.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 21 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Borax 6 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: aftas e estomatite.	Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: aftas e estomatite. <u>Mucosa bucal queimante, com aftas doloridas que podem sangrar ao comer. Aftas na superfície interna das bochechas que dificulta comer/beber.</u>	<input type="checkbox"/> Incluído <input type="checkbox"/> Excluído <input checked="" type="checkbox"/> Nova Redação <input type="checkbox"/> Nenhuma contribuição

		incorporada () Sem contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 22 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Bryonia alba 12 CH</p> <p>Orientações para o preparo. Gotas Preparar, com etanol a 30%, a partir da Bryonia alba 11 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir de Bryonia alba 12 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: gripe e estados gripais; secura de mucosas; tosse seca e dolorosa com grande sede; dor articular que piora com o movimento e melhora com o repouso.</p>	<p>Bryonia alba 126 CH</p> <p>Orientações para o preparo: Gotas Preparar, com etanol a 30% <u>(v/v)</u>, a partir da Bryonia alba 115 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir de Bryonia alba 126 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: gripe e estados gripais; secura de mucosas; tosse seca e dolorosa com grande sede; dor articular que piora com o movimento e melhora com o repouso <u>e pela forte pressão ou deitando sobre o lado dolorido.</u></p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Também foram alteradas as dinâmizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 e foram feitas correções de informações.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 23 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Cactus grandiflorus 5 CH</p> <p>Nome Homeopático: Cactus grandiflorus. Sinonímia Homeopática: Selenicereus glandiflorus e Cereus glandiflorus. Formas farmacêuticas: Gotas, glóbulos, tabletes, ou comprimidos. Orientações para o preparo. Gotas Preparar, com etanol a 30%, a partir da Cactus grandiflorus 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir de Cactus grandiflorus 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: cefaleia dos hipertensos; metrorragias de sangue negro, com coágulos, dores constrictivas ginecológicas. Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido quatro vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas. REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 1. São Paulo: Robe Editorial, 2003.</p>	<p>Monografia excluída.</p>	<p>() Incluído (x) Excluído () Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>

<p>CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. DEMARQUE, D. <i>et al.</i> Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009. GUERMONPREZ, M.; PINKAS, M.; TORCK, M. Matière Médicale Homéopathique. France: CEDH, 2005. VANNIER, L.; POIRIER, J. Précis de matière médicale homéopathique. Paris: Doin, 1985.</p>		
<p>Justificativa: após reavaliação da monografia o CTT Homeopatia decidiu pela sua exclusão.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 24 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Calcarea carbônica 6 CH Nome Homeopático: Calcarea carbônica. Sinonímia Homeopática: Calcarea ostreica; Calcarea carbonica Hahnemanni; Calcarea ostrearum e Calcii carbonas ostrearum. Formas farmacêuticas: gotas, glóbulos, tabletes, ou comprimidos. Orientações para o preparo. Gotas Preparar, com etanol a 30%, a partir da Calcarea carbonica 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: distúrbios do crescimento: caracterizado pela demora do fechamento das fontanelas e/ou atraso na marcha ou dentição, em indivíduos brevílineos com tendência a obesidade; auxiliar para a formação de calo ósseo. Posologia sugerida: duas gotas, ou dois glóbulos, ou dois tabletes, ou comprimido duas vezes ao dia, por pelo menos um mês.</p>	<p>Calcarea carbônicacarbonica 6 CH Nome Homeopático: Calcarea carbônicacarbonica. Orientações para o preparo: Gotas Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Calcarea carbonica 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: <u>rinofaringites, otites, amidalites e/ou bronquites em paciente com ou história de</u> distúrbios deo crescimento: caracterizado pela demora do fechamento das fontanelas e/ou atraso na marcha ou dentição, <u>em indivíduos brevílineos com</u> tendência a obesidade; auxiliar para a formação de calo ósseo. Posologia sugerida: <u>duascinco</u> gotas, ou <u>deiscinco</u> glóbulos, ou <u>dois</u> tabletes, ou <u>um</u> comprimido duas vezes ao dia, por pelo menos um mês.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 25 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Calcarea fluorica 6 CH Orientações para o preparo: Gotas Preparar, com etanol a 30%, a partir da Calcarea fluorica 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir de Calcarea fluorica 6 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: sensação de dor e peso relacionadas às varizes dos membros inferiores; dermatites varicosas; osteoporose.</p>	<p>Orientações para o preparo: Gotas Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Calcarea fluorica 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir de Calcarea fluorica 6 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: sensação de dor e peso relacionadas às varizesvarizes dos membros inferiores <u>com sensação de dor e peso</u>; dermatites varicosas; osteoporose. <u>Melhora pelo movimento contínuo, pelo calor e aplicações quentes e piora pela mudança de tempo, pela umidade e durante o repouso.</u></p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		

CONTRIBUIÇÃO Nº 26 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Calcarea phosphorica 6 CH</p> <p>Sinonímia Homeopática: Calcium phosphoricu, Calcarea phosphorata e Calcium phosphas.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: crescimento. Formação lenta de ósseos e tecidos, com crescimento rápido na adolescência e emagrecimento rápido com transtorno do crescimento. Dentição difícil ou retardada. Raquitismo. Reumatismo. Auxiliar para a formação de calo ósseo. Fechamento tardio da fontanela.</p>	<p>Sinonímia Homeopática: Calcium phosphoricu<u>phosphoricum</u>, Calcarea phosphorata e Calcium phosphas.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: transtornos de crescimento. Formação lenta de ósseos e tecidos, com principalmente devido ao crescimento rápido na adolescência e emagrecimento rápido com transtorno do crescimento; <u>dores na coluna, joelhos, cefaleias, astenia dos adolescentes.</u> Dentição difícil ou retardada. Raquitismo. Reumatismo. Displasia do esmalte que dá aos dentes uma coloração amarela acompanhada de muitas cáries. Auxiliar para a formação de calo ósseo. Fechamento tardio da fontanela.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
CONTRIBUIÇÃO Nº 27 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Calendula officinalis 6 CH</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: cicatrização. Ação externa e interna sobre todas as feridas traumáticas produzindo a cicatrização rápida e impedindo a supuração. Antisséptico. Úlceras varicosas. Úlceras inflamadas e antigas. Fissura dos mamilos. Antibacteriano, Antifúngico e Anti-inflamatório. Feridas cirúrgicas.</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: problemas de cicatrização. <u>Antisséptico.</u> Ação externa e interna sobre todas as feridas traumáticas <u>produzindo facilitando</u> a cicatrização <u>rápida</u> e impedindo a supuração. Antisséptico. Úlceras varicosas. Úlceras inflamadas e antigas. Fissura dos mamilos. <u>Antibacteriano, Antifúngico e Anti-inflamatório.</u> Feridas cirúrgicas.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.</p>		
CONTRIBUIÇÃO Nº 28 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Cantharis vesicatoria 6 CH</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: cistite. Irritação e inflamação de mucosas digestivas e urinárias com dores ardentes e tenesmos.</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: cistite. Irritação e inflamação de mucosas digestivas e urinárias com dores ardentes e tenesmos. <u>Queimação intensa e dor “cortante como um golpe de canivete”. Impressão da pele ou da mucosa estarem em carne viva. Melhora pelas fricções, pelo calor e aplicações quentes. Piora pelo toque, pela palpação e durante a micção.</u></p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.</p>		
CONTRIBUIÇÃO Nº 29 (MAIORES ESCLARECIMENTO VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições

<p>Carbo vegetabilis 6 CH</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: Flatulência com acúmulo de gases na região do estômago, com desconforto que melhora pela eructação.</p> <p>REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003.</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: flatulência com acúmulo de gases na região do estômago, com desconforto que melhora pela eructação; <u>e piora ao deitar, ao anoitecer e após ingestão de alimentos gordurosos.</u></p> <p>REFERÊNCIAS <u>STEVEN B. KAYNE e LEE R. KAYNE. Homeopathic prescribing pocket companion</u> Primeira Edição. London: Pharmaceutical Press, 2007 <u>MICHÈLE BOIRON e ALAIN PAYRE-FICOT. Homéopathie- le conseil au quotidien.</u> Sainte-Foy-lès-Lyon: Boiron , 1996. BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.</p>		
<p align="center">CONTRIBUIÇÃO Nº 30 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p align="center">Texto submetido à consulta pública</p>	<p align="center">Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p align="center">Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Carduus marianus 6 CH</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: hepatoprotetor.</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: <u>hepatoprotetor.</u> <u>Indicações: dispepsia de origem hepatobiliar, com sensação de plenitude na região hepática, tendência a constipação intestinal e pode apresentar dores nestas regiões que agravam pela pressão e/ou movimento.</u></p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.</p>		
<p align="center">CONTRIBUIÇÃO Nº 31 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p align="center">Texto submetido à consulta pública</p>	<p align="center">Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p align="center">Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Causticum 6 CH</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: reumático. Paralisia com emagrecimento, rigidez articular, dores de artrose, tendinite, verrugas peri e subungueais, de nariz, pálpebras e lábios.</p> <p>REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003.</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: <u>reumático.—Paralisadores reumáticas articulares, tendinosas ou musculares com emagrecimento,tendência a rigidez articular, dores de artrose, tendinite, verrugas perisensações dos tendões encurtados, incontinência urinária, que agravam pelo frio e subungueais, de nariz, pálpebras melhora pelo calor, tempo úmido e lábios chuvoso.</u></p> <p>REFERÊNCIAS <u>STEVEN B. KAYNE e LEE R. KAYNE. Homeopathic prescribing pocket companion</u> Primeira Edição. London: Pharmaceutical Press, 2007 <u>MICHÈLE BOIRON e ALAIN PAYRE-FICOT. Homéopathie- le conseil au quotidien.</u> Sainte-Foy-lès-Lyon: Boiron , 1996. BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>

Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 32 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Chelidonium majus 6 CH</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicação: enfermidades hepatobiliares com pele, conjuntivas, urina e fezes amareladas.</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicação: enfermidades hepatobiliares com <u>pele, conjuntivas, urina e fezes amareladas</u>, <u>dor em pontadas nesta região que irradia para o ângulo inferior da escápula direita</u> e <u>tendência a</u> fezes amareladas.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 33 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>China officinallis 5 CH</p> <p>Orientações para o preparo.</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir da China officinallis 4.CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes e comprimidos. Preparar a partir da China officinallis .5 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: diarreia. Enfermidades gástricas, vesiculares e intestinais, colites pós-parasitárias, flatulência. Febres intermitentes. Gastroenterite aguda, inchaço do abdômen.</p>	<p>China officinallis <u>56</u> CH</p> <p>Orientações para o preparo:</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir da China officinallis <u>4-5</u> CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir da China officinallis <u>.56</u> CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: diarreia <u>indolores, mas esgotantes, cólicas flatulentas acompanhadas de distensão abdominal com borborismos.</u> Enfermidades gástricas, vesiculares e intestinais, colites pós-parasitárias, flatulência. <u>Febres intermitentes. Gastroenterite aguda, inchaço do abdômen.</u></p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 34 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Cocculus indicus 6 CH</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: vertigem com sensação da cabeça "oca" frequentemente associada a um estado de enjôo/náuseas. Tontura. Fraqueza extrema, seguida de um estado de náusea e vertigens, em relação a lesão orgânica ou consecutiva a estresse ou insônia. Enjôo por movimento e enjôo e vômito durante a gravidez.</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: <u>vertigem com sensação da cabeça "oca" frequentemente associada a um estado de enjôo/náuseas. Tontura. Fraqueza extrema, seguida de um estado de náusea e vertigens, em relação a lesão orgânica ou consecutiva a estresse ou insônia. Enjôo por movimento e enjôo e vômito durante a gravidez.</u></p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 35 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		

Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Coffea cruda 12 CH</p> <p>Orientações para o preparo.</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Coffea cruda 11 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes e comprimidos. Preparar a partir da Coffea cruda 12 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: insônia; não consegue dormir devido à abundância de pensamentos. Dores de cabeça intoleráveis acompanhadas de agitação e desespero. Dor de dente aliviada com água gelada.</p>	<p>Coffea cruda 126 CH</p> <p>Orientações para o preparo:</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Coffea cruda 145 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir da Coffea cruda 126 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: insônia; não consegue dormir devido à abundância de pensamentos. Dores de cabeça intoleráveis acompanhadas de agitação e desespero. Dor de dente aliviada com água gelada.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Também foram alteradas as dinâmizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 e foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 36 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Colocynthis 5 CH</p> <p>Orientações para o preparo.</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Colocynthis 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir da Colocynthis 5 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: cólicas com abdômen distendido e dolorido, que obriga o doente a se dobrar em dois.</p>	<p>Colocynthis 56 CH</p> <p>Orientações para o preparo:</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Colocynthis 45 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir da Colocynthis 56 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: cólicas com abdômen distendido e dolorido, que obriga o doente a se dobrar em dois e que melhoram pelo calor e emissão de gases; diarreias dolorosas com cólicas violentas.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 37 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Conium maculatum 12 CH</p> <p>Orientações para o preparo.</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Conium maculatum 11 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes e comprimidos</p>	<p>Conium maculatum 126 CH</p> <p>Orientações para o preparo:</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Conium maculatum 145 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes e comprimidos</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada</p>

<p>Preparar a partir da Conium maculatum 12 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: vertigens ao virar a cabeça ou simplesmente os olhos, mesmo estando deitado.</p>	<p>Preparar a partir da Conium maculatum 426 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: vertigens ao virar a cabeça ou simplesmente os olhos, mesmo estando deitado. <u>Sensação que os objetos giram em torno de si.</u></p>	<p>() Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Também foram alteradas as dinâmizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 e foram feitas correções de informações.</p>		
<p align="center">CONTRIBUIÇÃO Nº 38 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p align="center">Texto submetido à consulta pública</p>	<p align="center">Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p align="center">Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Crataegus oxyacantha 5 CH Nome Homeopático: Crataegus. Sinonímia Homeopática: Crataegus apiifolia; Crataegus atropurpurea; Crataegus azarella; Crataegus bruantii; Mespilus apiifolia e Oxyacantha apiifolia. Formas farmacêuticas: gotas, glóbulos, tabletes ou comprimidos. Orientações para o preparo. Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Crataegus 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos. Preparar a partir da Crataegus 5 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: insônia dos cardíacos. Posologia sugerida: cinco gotas ou cinco glóbulos ou três tabletes ou um comprimido quatro vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas. REFERÊNCIAS CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria Editora, 2000. VANNIER, L.; POIRIER, J. Précis de matière médicale homéopathique. Paris: Doin, 1985. VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003.</p>	<p>Monografia excluída.</p>	<p>() Incluído (x) Excluído () Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: após reavaliação da monografias o CTT Homeopatia decidiu pela sua exclusão.</p>		
<p align="center">CONTRIBUIÇÃO Nº 39 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p align="center">Texto submetido à consulta pública</p>	<p align="center">Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p align="center">Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Drosera rotundifolia 5 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: laringites e traqueobronquites com acessos de tosse, espasmódica, violenta, sufocante principalmente noturna que pode até desencadear vômitos e congestão facial.</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: laringites e traqueobronquites com acessos de tosse, espasmódica, violenta, sufocante principalmente noturna, que pode até desencadear vômitos e congestão facial.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>

Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 40 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Dulcamara 6 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: rinofaringites, obstrução nasal, asma e traqueobronquite que sobrevêm à exposição ao tempo úmido e frio.	Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: rinofaringites, obstrução nasal, asma <u>ou</u> traqueobronquite que sobrevêm à exposição ao tempo úmido e frio.	<input type="checkbox"/> Incluído <input type="checkbox"/> Excluído <input checked="" type="checkbox"/> Nova Redação <input type="checkbox"/> Nenhuma contribuição incorporada <input type="checkbox"/> Sem contribuição
Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 41 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Eupatorium perfoliatum 5 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: febre acompanhada de sensação de dores nos ossos do tipo quebra-dura, prostração generalizada, cefaleia e/ou dores nos globos oculares como nas síndromes gripais e de dengue.	Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: febre acompanhada de sensação de dores nos ossos do tipo quebra-dura, prostração generalizada, <u>náuseas</u> , cefaleia e/ou dores nos globos oculares como nas síndromes gripais e de dengue.	<input type="checkbox"/> Incluído <input type="checkbox"/> Excluído <input checked="" type="checkbox"/> Nova Redação <input type="checkbox"/> Nenhuma contribuição incorporada <input type="checkbox"/> Sem contribuição
Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 42 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Ferrum metallicum 6 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).	Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).	<input type="checkbox"/> Incluído <input type="checkbox"/> Excluído <input checked="" type="checkbox"/> Nova Redação <input type="checkbox"/> Nenhuma contribuição incorporada <input type="checkbox"/> Sem contribuição
Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 43 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Ferrum phosphoricum 6 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).	Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: febre ou inflamação do sistema respiratório de aparecimento progressivo e febre moderada; auxiliar no tratamento de	<input type="checkbox"/> Incluído <input type="checkbox"/> Excluído <input checked="" type="checkbox"/> Nova Redação <input type="checkbox"/> Nenhuma

Indicações: febre ou inflamação do sistema respiratório de aparecimento progressivo e febre moderada; auxiliar no tratamento de rinofaringites, otites e bronquites com secreções.	rinofaringites, otites e bronquites com secreções.	contribuição incorporada () Sem contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 44 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Gelsemium sempervirens 6 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).	Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).	<input type="checkbox"/> Incluído <input type="checkbox"/> Excluído <input checked="" type="checkbox"/> Nova Redação <input type="checkbox"/> Nenhuma contribuição incorporada <input type="checkbox"/> Sem contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 45 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Graphites 6 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes e comprimidos (20 g).	Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes e comprimidos (20 g).	<input type="checkbox"/> Incluído <input type="checkbox"/> Excluído <input checked="" type="checkbox"/> Nova Redação <input type="checkbox"/> Nenhuma contribuição incorporada <input type="checkbox"/> Sem contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 46 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Hamamelis virginiana 6 CH Orientações para o preparo. Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v), a partir da Hamamelis virginiana 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir de Hamamelis virginiana 6 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL), glóbulos (12 g), tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: varizes com dores nas pernas; hemorroidas. REFERÊNCIAS CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática . 21ª edição. Livraria Teixeira LTDA. 1991.	Hamamelis virginiana 65 CH Orientações para o preparo: Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v), a partir da Hamamelis virginiana 54 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir de Hamamelis virginiana 65 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL), glóbulos (12 g), tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: varizes <u>nas pernas</u> com dores <u>nas pernas contusas, muito sensíveis ao toque</u> ; hemorroidas <u>com as mesmas características</u> . REFERÊNCIAS	<input type="checkbox"/> Incluído <input type="checkbox"/> Excluído <input checked="" type="checkbox"/> Nova Redação <input type="checkbox"/> Nenhuma contribuição incorporada <input type="checkbox"/> Sem contribuição

<p>HORVILLEUR, A. Vade-mécum da prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, Editora. 2003 SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria Editora, 2000. European Pharmacopeia Commission: European Pharmacopeia. 5th Edition, Council of Europe, Strasborug, Aubin, Ligugé (France), 2004.</p>			<p>CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21ª edição. Livraria Teixeira LTDA. 1991. DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009. HORVILLEUR, A. Vade-mécum da prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, Editora. 2003 SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria Editora, 2000. European Pharmacopeia Commission: European Pharmacopeia. 5th Edition, Council of Europe, Strasborug, Aubin, Ligugé (France), 2004. VOISIN, H. Manual de Matéria Médica para o Clínico. 2. ed. São Paulo: Andrei, 1984.</p>		
<p>Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>					
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 47 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>					
<p>Texto submetido à consulta pública</p>		<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>		<p>Síntese da análise das contribuições</p>	
<p>Hepar sulfur 6 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL), glóbulos (12 g), tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: furúnculos; abscessos, infecção bacteriana da pele; acnes pustulosas, úlceras da perna hipersensíveis ao toque; inflamação das mucosas respiratórias, sobretudo da laringe; sinusite. REFERÊNCIAS ALLEN, H. C. Sintomas-Chave da Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Dynamis editorial, 2000. VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 2. São Paulo: Organon, 2003. SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria Editora, 2000.</p>		<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL), glóbulos (12 g), tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: Tratamento <u>adjuvante em</u> furúnculos; abscessos, infecção bacteriana da pele; acnes pustulosas, úlceras da perna hipersensíveis ao toque; inflamação das mucosas respiratórias, sobretudo da laringe; <u>sinusite com hipersensibilidade à dor e intolerância ao menor contato com a zona inflamada</u>. REFERÊNCIAS ALLEN, H. C. Sintomas-Chave da Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Dynamis editorial, 2000. DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009. VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 2. São Paulo: Organon, 2003.</p>		<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>	
<p>Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.</p>					
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 48 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>					
<p>Texto submetido à consulta pública</p>		<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>		<p>Síntese da análise das contribuições</p>	
<p>Hydrastis canadensis 6 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL), glóbulos (12 g), tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: rinite, sinusite com secreção amarelada e espessa. Bronquite crônica dos idosos.</p>		<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL), glóbulos (12 g), tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: rinite, sinusite com secreção amarelada e espessa. Bronquite crônica dos idosos, rinorréia posterior escoriante, viscosa e espessa. Tosse seca com rouquidão e um pouco de expectoração amarelo-esverdeada principalmente em paciente com fraqueza no estado geral.</p>		<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>	
<p>Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.</p>					
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 49 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>					

Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Hypericum perforatum 6 CH</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: dor nevrálgica. Fratura e traumatismo. Feridas causadas por objetos pontiagudos e cortantes. Hemorróida.</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: dor nevrálgica. <u>Fratura e dores intensas das terminações nervosas ou ao longo do trajeto do nervo ocasionadas por fratura, traumatismo. Feridas causadas e/ou feridas</u> por objetos pontiagudos e cortantes. <u>Hemorróida.</u></p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 50 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Ignatia amara 30 CH</p> <p>Orientações para o preparo.</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir da Ignatia 29 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes ou comprimidos Preparar a partir da Ignatia 30 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: ansiedade. Estresse. Insônia após ser contrariado. Sensação de um bolo na garganta e aperto no estômago.</p>	<p>Ignatia amara 29 306 CH</p> <p>Orientações para o preparo:</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir da Ignatia 29 295 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes ou comprimidos Preparar a partir da Ignatia 30 306 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: ansiedade. <u>Estresse. Insônia após ser contrariado. Sensação de um , estresse, insônia em pacientes com tendência a alternância de humor, acompanhadas de sensação de</u> bolo na garganta e aperto no estômago.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Também foram alteradas as dinâmizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 e foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 51 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Ipecacuanha 5 CH</p> <p>Sinonímia Homeopática: Radix Ipeca; Cephaelis emética; Psychotria ipecacuanha e Ipeca officinalis.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: tosse espasmódica. Bronquite, Bronquiolite e asma. Nausea e vômito. Sensação de língua limpa.</p>	<p>Sinonímia Homeopática: Radix Ipeca; Cephaelis emética; Psychotria ipecacuanha e Ipeca officinalis e <u>Cephaelis ipecacuanha.</u></p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: tosse espasmódica. <u>Bronquite, Bronquiolite e asma. Nausea com náusea e vômito. Sensação de, associado a</u> língua limpa. <u>Auxiliar no tratamento da bronquite, bronquiolite e asma.</u></p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 52 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		

Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Iris versicolor 6 CH	Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: dor de cabeça. Sensação de ardor no trato gastrointestinal. Salivação. Vômito, dor abdominal e diarreia aquosa ou gordurosa.	<input type="checkbox"/> Incluído <input type="checkbox"/> Excluído <input checked="" type="checkbox"/> Nova Redação <input type="checkbox"/> Nenhuma contribuição incorporada <input type="checkbox"/> Sem contribuição
Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: dor de cabeça. Sensação de ardor no trato gastrointestinal. Salivação. Vômito, dor abdominal e diarreia aquosa ou gordurosa.		
Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 53 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Kalium bichromicum 6 CH	Sinonímia Homeopática: <u>KaliumKali</u> bichromicum; Kalium dichromicum e Potassium bichromate. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: sinusite; rinorreia com muco espesso. Erupções cutâneas. Dores de estômago.	<input type="checkbox"/> Incluído <input type="checkbox"/> Excluído <input checked="" type="checkbox"/> Nova Redação <input type="checkbox"/> Nenhuma contribuição incorporada <input type="checkbox"/> Sem contribuição
Sinonímia Homeopática: Kalium bichromicum; Kalium dichromicum e Potassium bichromate. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: sinusite; rinorreia com muco espesso. Erupções cutâneas. Dores de estômago.		
Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 54 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Kalium phosphoricum 6 CH	Orientações para o preparo: Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Kali phosphoricum 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: cansaço físico e mental, <u>acompanhadas por cefaleias, distúrbios de memória, insônia por-, Melhora pelo movimento lento e piora pela fadiga e pelo trabalho intelectual.</u>	<input type="checkbox"/> Incluído <input type="checkbox"/> Excluído <input checked="" type="checkbox"/> Nova Redação <input type="checkbox"/> Nenhuma contribuição incorporada <input type="checkbox"/> Sem contribuição
Orientações para o preparo. Gotas Preparar em etanol a 30% a partir do Kali phosphoricum 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: cansaço físico e mental, insônia por fadiga.		
Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 55 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Lachesis muta 6 CH	Orientações para o preparo: Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Lachesis 5 CH, conforme	<input type="checkbox"/> Incluído <input type="checkbox"/> Excluído <input checked="" type="checkbox"/> Nova Redação
Orientações para o preparo. Gotas		

<p>Preparar em etanol a 30% a partir do Lachesis 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: sintomas da menopausa. Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido quatro vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p>	<p>Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: sintomas da menopausa. Indicações: distúrbios da menopausa e da menstruação. Ondas de calor, cefaleia, modificações no humor que são agravadas no período pré-menstrual, principalmente quando há um atraso ou insuficiência ou ausência da menstruação. Os sintomas melhoram com a vinda da menstruação. Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido quatreduas vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p>	<p>() Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 56 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Ledum palustre 5 CH Orientações para o preparo: Gotas Preparar em etanol a 30% a partir do Ledum 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: dores reumáticas que melhoram pelo frio. Picada de insetos.</p>	<p>Orientações para o preparo: Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Ledum 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: dores reumáticas que melhoram pelo frio. Picada de insetos. Melhora pelo repouso e pelo frio (imersão na água gelada) e piora pelo movimento, à noite, pelo calor (cama, cobertas).</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 57 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Lemna minor 5 CH Gotas Preparar em etanol a 30% a partir de Lemna minor 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: coriza mucopurulenta com crostas. REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2. São Paulo: Robe Editorial, 2003 CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. DEMARQUE, D. <i>et al.</i> Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009. HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003. SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria Editora, 2000. VANNIER, L. Manual de Terapêutica Homeopática. São Paulo: Organon, 2004.</p>	<p>Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir de Lemna minor 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: rinite com coriza mucopurulenta com crostas. Odor pútrido do nariz, diminuição ou perda do olfato, gosto pútrido de manhã ao se levantar devido ao corrimento retrorrenal. REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2. São Paulo: Robe Editorial, 2003 CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. DEMARQUE, D. <i>et al.</i> Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>

<p>VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 2. São Paulo: Organon, 2003.</p>	<p>HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003. SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria Editora, 2000. VANNIER, L. Manual de Terapêutica Homeopática. São Paulo: Organon, 2004. VANNIER, L.; POIRIER, J. Précis de matière médicale homéopathique. Paris: Doin, 1985. VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 2. São Paulo: Organon, 2003.</p>	
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p align="center">CONTRIBUIÇÃO Nº 58 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p align="center">Texto submetido à consulta pública</p>	<p align="center">Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p align="center">Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Lobelia inflata 5 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: auxiliar no tratamento das dispneias com sensação de constrição do peito.</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: auxiliar no tratamento das dispneias asmátiformes com sensação de constrição do peito de origem respiratória.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.</p>		
<p align="center">CONTRIBUIÇÃO Nº 59 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p align="center">Texto submetido à consulta pública</p>	<p align="center">Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p align="center">Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Lycopodium clavatum 6 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: dispepsia Dispepsia flatulenta com sensação de peso no estômago com pronta saciedade. Dores vesiculares. REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2. São Paulo: Robe Editorial, 2003. BRASIL. Farmacopeia Homeopática Brasileira. 3. ed., Brasília, DF: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2011. CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003.</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: dispepsia Dispepsia flatulenta com sensação de peso no estômago com pronta saciedade. Dores—vesicularesDistensão abdominal principalmente infra umbilical em pacientes com tendência a constipação intestinal, dores de cabeça relacionadas aos distúrbios digestivos com agravação geral ao final da tarde. Melhora pelo ar fresco e pelos alimentos e bebidas quentes. Piora geral no final da tarde. REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2. São Paulo: Robe Editorial, 2003. BRASIL. Farmacopeia Homeopática Brasileira. 3. ed., Brasília, DF: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2011. CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. DEMARQUE, D. et al. Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009. HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>

Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 60 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Magnesia phosphorica 6 CH</p> <p>Sinonímia Homeopática: Magnesi phosphas e Magnesium phosphoricum.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: cólica abdominal (intestinal e hepática) aguda. Nevralgias, que melhoram com o calor. Câibra e contraturas musculares.</p> <p>Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido, quatro vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p>	<p>Sinonímia Homeopática: <u>MagnesiMagnesii</u> phosphas e Magnesium phosphoricum.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: <u>cólica—abdominal—(intestinal,cólicas intestinais acompanhada de diarreias dolorosas, cólicas do lactente que melhoram pelo calor e hepática) aguda/ou flexão das coxas sobre a bacia.</u> Nevralgias, que <u>melhoram aparecem e desaparecem bruscamente.</u> <u>Nevralgias faciais direitas com o calor.dores fulgurantes.</u> Câibra e contraturas musculares.Posologia sugerida: <u>cinco gotas, ou cinco glóbulos, agravadas pelo ar frio e melhoradas pelo calor e/ou pela flexão das coxas sobre a bacia.</u></p> <p>Posologia sugerida: <u>cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido, quatro vezes ao dia, três tabletes,Para os lactentes, 2 gotas ou um comprimido,1 tablete até</u> quatro vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 61 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Matricaria chamomilla 6 CH</p> <p>Sinonímia Homeopática: Chamomilla vulgaris e Anthemis vulgaris.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: transtornos da primeira dentição. Indicação para cólicas de lactentes e crianças com inquietação e diarreia. Dismenorria.</p> <p>Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido, quatro vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p>	<p><u>Chamomilla 6 CH</u></p> <p>Sinonímia Homeopática: <u>Matricaria chamomilla,</u> Chamomilla vulgaris e Anthemis vulgaris.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: <u>distúrbios da dentição: dores no lactente habitualmente comportado e gentil, que se torna colérico e insuportável por causa da dor no momento da eclosão dentária. Síndromes febris concomitantes à dentição que podem ser acompanhadas de uma otite, gastroenterite ou bronquite.</u></p> <p>Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido, quatro vezes ao dia. <u>Para os lactentes, 2 gotas ou 1 tablete até quatro vezes ao dia.</u> Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 62 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Mercurius solubilis 6 CH</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12</p>	<p>() Incluído</p>

<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: inflamação da faringe e amígdalas com vermelhidão. Febre.</p>	<p>g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: inflamação da faringe e amígdalas com vermelhidão. <u>Febre, com disfagia que se irradia para os ouvidos, salivação abundante e mau hálito. Arrepios a flor da pele nos episódios febris. Agrava ao deglutir e à noite.</u></p>	<p>() Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.</p>		
<p align="center">CONTRIBUIÇÃO Nº 63 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p align="center">Texto submetido à consulta pública</p>	<p align="center">Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p align="center">Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Myristica sebifera 6 CH Nome Homeopático: Myristica sebifera 6 CH. Orientações para o preparo. Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir da Myristica sebifera 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes ou comprimidos Preparar a partir da Myristica sebifera 6 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: indicado para supurar abscessos cutâneos.</p>	<p>Myristica sebifera 65 CH Nome Homeopático: Myristica sebifera 6CH. Orientações para o preparo: Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir da Myristica sebifera 54 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes ou comprimidos Preparar a partir da Myristica sebifera 6 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: <u>indicado para supurar tratamento adjuvante aos abscessos cutâneos e panarícios. Favorece abrir o abscesso.</u></p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p align="center">CONTRIBUIÇÃO Nº 64 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p align="center">Texto submetido à consulta pública</p>	<p align="center">Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p align="center">Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Natrum muriaticum 6 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: Coriza brusca, aquosa com lacrimejamento abundante. Dermatite atópica localizada nos cotovelos, joelhos e cabeça. Dermatite seborreica. Prisão de ventre pelos alimentos farinhosos.</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: <u>Coriza brusea, rinite, espirros, coriza aquosa com e lacrimejamento abundante. Dermatite atópica localizada nos cotovelos, joelhos e cabeça abundantes que aparecem bruscamente em pacientes emagrecidos e com tendência a depressão</u> Dermatite seborreica. <u>Prisão de ventre pelos alimentos farinhosos.</u></p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.</p>		
<p align="center">CONTRIBUIÇÃO Nº 65 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p align="center">Texto submetido à consulta pública</p>	<p align="center">Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p align="center">Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Nux vomica 6 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: dispepsia por excesso alimentar ou de bebidas. Irritabilidade.</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: dispepsia por excesso alimentar ou de bebidas. <u>Irritabilidade Sonolência pós-prandial. Em pacientes com tendência a</u></p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma</p>

	irritabilidade e agressividade.	contribuição incorporada () Sem contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 66 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Passiflora incarnata 5 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).	Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).	() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 67 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Petroleum 6 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: dermatites e dermatoses que pioram no inverno/frio caracterizadas por rachaduras e fissuras nas extremidades; lesões vesiculosas secretantes e crostosas; pele espessa e aspecto de suja. Enjoo por movimento.	Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: dermatites e dermatoses que pioram no inverno/frio caracterizadas por rachaduras e fissuras nas extremidades; lesões vesiculosas secretantes e crostosas; pele espessa e aspecto de suja. Enjoo por movimento passivo (barco, carro, trem) e melhora fechando os olhos.	() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição
Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 68 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Phosphorus 12 CH Orientações para o preparo. Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Phosphorus 11 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes ou comprimidos Preparar a partir do Phosphorus 12 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: hepatoprotetor; adjuvante em hemorragia.	Phosphorus 126 CH Orientações para o preparo: Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Phosphorus 115 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes ou comprimidos Preparar a partir do Phosphorus 126 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: hepatoprotetor; adjuvante em hemorragia. Indicações: laringite com rouquidão que piora à noite, agravada pelo frio. Tosse seca com dor ardente no peito. Adjuvante em casos de	() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição

		hepatite viral. Em pacientes com tendência a alternar comportamento de ansiedade e tristeza.	
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Também foram alteradas as dinâmizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 e foram feitas correções de informações.</p>			
CONTRIBUIÇÃO Nº 69 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)			
Texto submetido à consulta pública		Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	
<p>Phytolacca 5 CH Orientações para o preparo. Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Phytolacca 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir do Phytolacca 5 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: faringites eritematosas acompanhadas de secura e dor na garganta com irradiação aos ouvidos a deglutição.</p>		<p>Phytolacca 56 CH Orientações para o preparo: Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Phytolacca 45 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir do Phytolacca 56 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: faringites eritematosas acompanhadas de secura e dor na garganta com irradiação aos ouvidos a deglutição. Melhora pelo tempo seco e repouso e piora pelo tempo frio e úmido.</p>	
<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>			
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>			
CONTRIBUIÇÃO Nº 70 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)			
Texto submetido à consulta pública		Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	
<p>Plantago major 5 CH Orientações para o preparo. Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Plantago major 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir do Plantago major 5 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p>		<p>Plantago major 56 CH Orientações para o preparo: Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Plantago major 45 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir do Plantago major 56 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p>	
<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>			
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>			
CONTRIBUIÇÃO Nº 71 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)			
Texto submetido à consulta pública		Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	
<p>Podophyllum 5 CH Orientações para o preparo. Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Podophyllum 4 CH, conforme Farmacopeia Homeopática</p>		<p>Podophyllum 56 CH Orientações para o preparo: Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Podophyllum 45 CH,</p>	
<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma</p>			

<p>Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos. Preparar a partir do Podophyllum 5 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: diarreia abundante, aquosa, irritante e que causa esgotamento.</p>	<p>conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir do Podophyllum 56 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: diarreia abundante, aquosa, irritante e que causa esgotamento. <u>Melhora pelo decúbito ventral e piora de manhã cedo (sobretudo para a diarreia) e pelo tempo úmido.</u></p>	<p>contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 72 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Pulsatilla 6 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: dores de cabeça frontal com lacrimejamento; cefaleia pela ingestão de alimentos gordurosos; inflamação das mucosas com secreção amarelada não irritantes. Rinites, rinofaringites e otites. Síndromes pré-menstruais; cefaleia por ausência de menstruação.</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: dores de cabeça frontal com lacrimejamento; eefaleiacefaleia pela ingestão de alimentos gordurosos; inflamação das mucosas com secreção amarelada não irritantes. Rinites, rinofaringites e otites. Síndromes pré-menstruais; cefaleia por ausência de menstruação.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 73 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Rhus toxicodendron 6 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: dores reumáticas provocadas ou agravadas pela umidade que melhora pelo movimento; dores ciáticas que melhoram pelo movimento contínuo. Entorces, dores das luxações. Tendinite.</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: dores reumáticas provocadas ou agravadas pela umidade que <u>melhoramelhoram</u> pelo movimento; dores ciáticas que melhoram pelo movimento contínuo. EntorcesEntorces, dores das luxações. Tendinite.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 74 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Rumex crispus 6 CH Orientações para o preparo. Gotas Preparar, com etanol a 30%, a partir da Rumex crispus 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p>	<p>Orientações para o preparo: Gotas Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Rumex crispus 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: tosse <u>violenta</u>,seca, <u>intensa</u>, provocada pela inspiração de</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>

<p>Indicações: tosse violenta, seca, provocada pela inspiração de ar frio; tendência a formar catarro nas mucosas, respiratórias e digestivas. Afonia.</p>	<p>ar frio, <u>mais localizada na fossa suora-esternal; a coceira excita a tosse</u>; tendência a formar catarro nas mucosas, respiratórias e digestivas. Afonia. <u>Rinites desencadeadas por correntes de ar</u>.</p>	<p>contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 75 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Ruta graveolens 6 CH Orientações para o preparo. Gotas Preparar, com etanol a 30%, a partir da Ruta graveolens 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: entorse; traumatismos (com extravasamento sanguíneo): entorses, simples ou complicados, luxações, <i>contusões periosteas do tipo machucadura dos ossos como se o paciente tivesse sido espancado</i>, tendinites, cistos sinoviais do punho, lombalgias; dores reumáticas, nos punhos e tornozelos; lesões em tendões e juntas, especialmente no pulso.</p>	<p>Orientações para o preparo: Gotas Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Ruta graveolens 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: entorse; traumatismos (com extravasamento sanguíneo); entorses, simples ou complicados, luxações, contusões periosteas do tipo machucadura dos ossos como se o paciente tivesse sido espancado, tendinites, cistos sinoviais do punho, lombalgias; dores reumáticas, nos punhos e tornozelos; lesões em tendões e juntas, especialmente no pulso.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 76 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Sabadilla officinarum 6 CH Orientações para o preparo. Gotas Preparar, com etanol a 30%, a partir da Sabadilla officinarum 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: rinite alérgica com sensação de ardência na mucosa; coriza com espirros espasmódicos, lacrimejamento e vermelhidão das pálpebras, dor de cabeça frontal, sensação de ardor e obstrução das narinas; distúrbios digestivos devido às parasitoses.</p>	<p>Orientações para o preparo: Gotas Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Sabadilla officinarum 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: rinite alérgica com sensação de ardência na mucosa; coriza com espirros espasmódicos, lacrimejamento e vermelhidão das pálpebras, dor de cabeça frontal, sensação de ardor e obstrução das narinas; distúrbios digestivos devido às parasitoses.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 77 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Sambucus nigra 6 CH Orientações para o preparo. Gotas Preparar, com etanol a 30%, a partir da Sambucus nigra 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p>	<p>Orientações para o preparo: Gotas Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Sambucus nigra 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição</p>

<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: tosse seca, coriza com obstrução nasal; rouquidão; tratamento sintomático da asma.</p>	<p>g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: tosse seca; <u>laringite intensa com agravação noturna</u>; coriza com obstrução nasal; rouquidão; <u>tratamento sintomático da asma</u> <u>transpiração profusa principalmente ao acordar</u>.</p>	<p>incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 78 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Sanguinaria canadensis 6 CH Orientações para o preparo. Gotas Preparar, com etanol a 30%, a partir da Sanguinaria canadensis 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: hipersensibilidade aos odores e ao frio ocasionando coriza aquosa, abundante, com espirros; tosse gripal seca ou úmida; tosses brônquicas com catarro laríngeo e traqueal com irritação local, congestão pulmonar aguda com expectoração aderente e viscosa. Cefaleias congestivas (hemicrania); enxaquecas intensas; vômitos alimentícios ou biliosos.</p>	<p>Orientações para o preparo: Gotas Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Sanguinaria canadensis 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: hipersensibilidade aos odores e ao frio ocasionando coriza aquosa, abundante, com espirros; tosse <u>tosse</u> gripal seca ou úmida; tosses brônquicas com catarro laríngeo e traqueal com irritação local, congestão pulmonar aguda com expectoração aderente e viscosa; <u>hipersensibilidade aos odores e ao frio</u>; Cefaleias congestivas (hemicrania); enxaquecas intensas; vômitos alimentícios ou biliosos.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 79 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Sepia succus 6 CH Orientações para o preparo. Gotas Preparar, com etanol a 30%, a partir da Sepia succus 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: cólica menstrual; importante remédio uterino; congestão passiva útero- ovarianas; ondas ou arrebatamentos de calor; congestão venosa portal, com insuficiência hepática e peso pélvico; acompanham-se muitas vezes de prolapso uterino; fraqueza de todos os tecidos; pacientes tuberculosas com perturbações hepáticas crônicas e reflexos uterinos; dispepsias, discinesias biliares com ou sem litíase, colopatias com constipação ou exoneações retais insuficientes; prolapso hemorroidário, enxaquecas; infecções de repetição do trato genital e dismenorreias; cólica pré-menstrual, com sensação de extrema fadiga ou de grande fraqueza.</p>	<p>Orientações para o preparo: Gotas Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Sepia succus 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: cólica menstrual; importante remédio uterino; congestão passiva útero- ovarianas; ondas ou arrebatamentos de calor; congestão venosa portal, com insuficiência hepática e peso pélvico; acompanham-se muitas vezes de prolapso uterino; fraqueza de todos os tecidos; pacientes tuberculosas com perturbações hepáticas crônicas e reflexos uterinos; dispepsias, discinesias biliares com ou sem litíase, colopatias com constipação ou exoneações retais insuficientes; prolapso hemorroidário, enxaquecas; infecções de repetição do trato genital e dismenorreias; cólica pré-menstrual, com sensação de extrema fadiga ou de grande fraqueza. Indicações: <u>sintomas da menopausa como ondas ou arrebatamentos ascendentes de calor em mulheres chorosas, irritáveis e indiferentes.</u></p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		

CONTRIBUIÇÃO Nº 80 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Silicea 6 CH</p> <p>Orientações para o preparo:</p> <p>Gotas Preparar, com etanol a 30%, a partir da Silicea 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes e comprimidos (20 g).</p> <p>INDICAÇÕES: constipação intestinal; constipação atônica com fezes de difícil evacuação, diarreias com síndromes de má absorção; inatividade ou paralisia retal, (piora antes e durante a menstruação), cefaleias crônicas; rinites e rinofaringites de repetição, sinusites e otorreias crônicas; supurações crônicas; inflamação crônica, indolente e tórpida (de uma mucosa, de uma adenite, de um osso ou cutânea); perturbações acompanhadas da formação de pus; amadurece abscessos uma vez que promove a supuração; panarício, úlceras crônica, fístula anal ou anorretal.</p> <p>Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido, quatro vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p>	<p>Orientações para o preparo:</p> <p>Gotas Preparar, com etanol a 30% (v/v), a partir da Silicea 5 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes e comprimidos (20 g).</p> <p>INDICAÇÕES: constipação intestinal; constipação atônica com fezes de difícil evacuação, diarreias com síndromes de má absorção; inatividade ou paralisia retal, (piora antes e durante a menstruação), cefaleias crônicas; rinites e rinofaringites de repetição, sinusites e otorreias crônicas; supurações crônicas; inflamação crônica, indolente e tórpida (de uma mucosa, de uma adenite, de um osso ou cutânea); perturbações acompanhadas da formação de pus; amadurece abscessos uma vez que promove a supuração; panarício, úlceras crônica, fístula anal ou anorretal.</p> <p>Indicações: <u>constipação intestinal do tipo atônica com fezes duras, secas de difícil evacuação em pacientes enfraquecidos e falta de reação geral.</u></p> <p>Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido, <u>quatroduas</u> vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
CONTRIBUIÇÃO Nº 81 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Spongia tosta 5 CH</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: Rouquidão. Tosse e irritação seca. Ardência ao falar. Laringite.</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: rouquidão. Tosse e irritação seca. <u>que melhora pelas bebidas quentes.</u> Ardência ao falar. Laringite.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.</p>		
CONTRIBUIÇÃO Nº 82 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Staphysagria 6 CH</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: Afecções urinárias. Prurido em diversas partes do corpo. Ardor uretral entre as</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: afecções urinárias. <u>Prurido em diversas partes do corpo.</u> Ardor uretral entre as micções que cessa ao urinar. <u>Cistite e</u> Cistite</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma</p>

<p>micções que cessa ao urinar. Cistite e Cistite consecutiva a relação sexual. Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido, quatro vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p>	<p>consecutiva a relação sexual. Hordéolos recidivantes. Em pacientes sensíveis, susceptíveis e que se maçoam com facilidade. Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido, quatro^{três} vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p>	<p>contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p align="center">CONTRIBUIÇÃO Nº 83 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p align="center">Texto submetido à consulta pública</p>	<p align="center">Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p align="center">Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Sticta pulmonaria 6 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: Tosse seca incessante. Sinusite. Coriza aguda e crônica. Crosta seca no nariz. Rinite alérgica.</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: tosse seca incessante. Sinusite, traqueíte. Sinusites frontais. Coriza aguda e crônica. Crosta seca que melhoram pelo aparecimento da rinorreia. Secura da garganta e traqueia, sensação de peso e plenitude no nariz. Rinite alérgica.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.</p>		
<p align="center">CONTRIBUIÇÃO Nº 84 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p align="center">Texto submetido à consulta pública</p>	<p align="center">Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p align="center">Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Sulphur 6 CH Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: erupções da pele com prurido. Inflamação da pele vermelhidão, sensação de calor, eczema, furúnculo de repetição, sarnas, conjuntivite. Terços repetido. Psoríase. Posologia sugerida: cinco gotas ou cinco glóbulos ou três tabletes ou um comprimido quatro vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p>	<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: erupções da pele com prurido. Inflamação da pele vermelhidão, sensação de calor, eczema, furúnculo de repetição, sarnas, conjuntivite. Terços repetido. Psoríase. Posologia sugerida: cinco gotas ou cinco glóbulos ou três tabletes ou um comprimido quatro^{duas} vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.</p>		
<p align="center">CONTRIBUIÇÃO Nº 85 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p align="center">Texto submetido à consulta pública</p>	<p align="center">Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p align="center">Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Symphytum officinale 6 CH Orientações para o preparo. Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir da Symphytum 5 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir da Symphytum 6 CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g). Indicações: pré e pós-operatório. Traumatismo dos ossos e retardo na consolidação das fraturas</p>	<p>Symphytum officinale 6⁵ CH Orientações para o preparo: Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir da Symphytum 5⁴ CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Glóbulos, tabletes e comprimidos Preparar a partir da Symphytum 6⁵ CH conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor. Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>

e traumatismo do globo ocular por soco.		Indicações: pré e pós-operatório . traumatismo dos ósseos e retardo na consolidação das fraturas e traumatismo . <u>Traumatismo hiperálgicos</u> do globo ocular por soco .	
Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.			
CONTRIBUIÇÃO Nº 86 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)			
Texto submetido à consulta pública		Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	
Thuya occidentalis 6 CH		Síntese da análise das contribuições	
<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido, quatro vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p>		<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Posologia sugerida: cinco gotas, ou cinco glóbulos, ou três tabletes, ou um comprimido, <u>quatroduas</u> vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p>	
		<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>	
Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.			
CONTRIBUIÇÃO Nº 87 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)			
Texto submetido à consulta pública		Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	
Valeriana officinalis 5 CH		Síntese da análise das contribuições	
<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: Insônia leve.</p>		<p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: insônia leve <u>principalmente em pacientes agitados e com tendência a variações de humor</u>.</p>	
		<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>	
Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias.			
CONTRIBUIÇÃO Nº 88 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)			
Texto submetido à consulta pública		Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	
Veratrum album 6 CH		Síntese da análise das contribuições	
<p>Nome Homeopático: Veratrum álbum.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: Diarréia abundante acompanhada de intensa dor abdominal e prostração.</p>		<p>Nome Homeopático: Veratrum <u>álbumalbum</u>.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: <u>diarreia</u> abundante acompanhada de intensa dor abdominal e, <u>prostração e transpiração fria abundante, sobretudo na testa</u>.</p>	
		<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>	
Justificativa: a palavra "sugerida" foi excluída do item "quantidade sugerida para dispensação" e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Foram feitas correções de informações.			
CONTRIBUIÇÃO Nº 89 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)			
Texto submetido à consulta pública		Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	
Síntese da análise das contribuições		Síntese da análise das contribuições	

	alteração)	análise das contribuições
<p>Zincum metallicum 12 CH</p> <p>Nome Homeopático: Zincum metallicum 12 CH</p> <p>Orientações para o preparo.</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Zincum metallicum 11 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes e comprimidos. Preparar a partir do Zincum metallicum 12 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: esgotamento intelectual ou nervoso.</p> <p>Posologia sugerida: tomar cinco gotas ou cinco glóbulos ou três tabletes ou um comprimido quatro vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p>	<p>Zincum metallicum 426 CH</p> <p>Nome Homeopático: Zincum metallicum 426 CH</p> <p>Orientações para o preparo:</p> <p>Gotas Preparar em etanol a 30% (v/v) a partir do Zincum metallicum 445 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor.</p> <p>Glóbulos, tabletes e comprimidos. Preparar a partir do Zincum metallicum 426 CH, conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira.</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: gotas (15 mL); glóbulos (12 g); tabletes (20 g) e comprimidos (20 g).</p> <p>Indicações: esgotamento intelectual ou nervoso. <u>dificuldades escolares, estafa intelectual com distúrbios da memória ou agitação contínua dos membros inferiores; insônia com síndrome das pernas inquietas.</u></p> <p>Posologia sugerida: tomar cinco gotas ou cinco glóbulos ou três tabletes ou um comprimido <u>quatroduas</u> vezes ao dia. Conforme a melhora dos sintomas, espaçar as tomadas.</p>	<p>() Incluído () Excluído (x) Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: a palavra “sugerida” foi excluída do item “quantidade sugerida para dispensação” e foram verificadas e aprimoradas as indicações (se o caso) para todas as monografias. Também foram alteradas as dinâmizações de alguns medicamentos para 6 CH a fim de torná-los isentos de prescrição (alteração solicitada em contribuições), conforme Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 e foram feitas correções de informações.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 90 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Aesculus hippocastanum TM</p> <p>Nome Homeopático: Aesculus.</p> <p>Sinonímia Homeopática: Castanha equina e Hippocastanum vulgare.</p> <p>Forma Farmacêutica para Dispensação: Creme, pomada, gel ou supositório.</p> <p>Orientação para o preparo. Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v).</p> <p>Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote opacos com 30 g), supositório (embalagem com 6 unidades).</p> <p>Indicações: anti-hemorroidas, tratamento para fissuras anais.</p> <p>Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia. Aplicar o supositório uma vez ao dia.</p> <p>Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade aos componentes da fórmula.</p> <p>REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2. São Paulo: Robe Editorial, 2003. VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003. CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991.</p>	<p>Monografia excluída.</p>	<p>() Incluído (x) Excluído () Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 91 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		

Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Apis mellifica 6 CH</p> <p>Nome Homeopático: Apis mellifica. Sinonímia Homeopática: Apis. Formas Farmacêuticas: Creme, pomada ou gel. Orientação para o preparo. Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v). Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote opacos com 30 g) Indicações: picada de insetos, edema, inflamações agudas na pele Posologia sugerida: Aplicar externamente três vezes ao dia REFERÊNCIAS HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003. VANNIER, L.; POIRIER, J. Matéria Médica Homeopática. México: Porrua, 1979.</p>	<p>Monografia excluída.</p>	<p>() Incluído (x) Excluído () Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.</p>		
<p align="center">CONTRIBUIÇÃO Nº 92 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Arnica Montana TM</p> <p>Nome Homeopático: Arnica montana. Sinonímia Homeopática: Arnica; Caltha alpina; Chrysanthemum latifolium; Doronicum germanicum e Doronicum montanum. Forma Farmacêutica para Dispensação: creme, pomada ou gel. Orientação para o preparo. Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v). Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30 g). Indicações: contusões e dores musculares. Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia. Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade aos componentes da fórmula. . Não usar com a pele escoriada. REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003. CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Organon, 2004. VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003.</p>	<p>Monografia excluída.</p>	<p>() Incluído (x) Excluído () Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.</p>		
<p align="center">CONTRIBUIÇÃO Nº 93 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições

<p>Belladonna TM</p> <p>Nome Homeopático: Belladonna. Sinonímia Homeopática: Atropa beladonna; Solanum furiosum e Belladonna baccifera Forma Farmacêutica para Dispensação: Creme, pomada ou gel. Orientação para o preparo. Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v). Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bispaga ou pote, opacos com 30 g). Indicações: processos inflamatórios, furúnculos e abscessos. Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia. Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade aos componentes da fórmula. REFERÊNCIAS CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. VANNIER, L.; POIRIER, J. Matéria Médica Homeopática. México: Porrúa, 1979. VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003.</p>	<p>Monografia excluída.</p>	<p>() Incluído (x) Excluído () Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 94 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Calendula officinalis TM</p> <p>Nome Homeopático: Calendula officinalis. Sinonímia Homeopática: Calendula; Caltha officinalis e Caltha vulgaris. Forma Farmacêutica para Dispensação: Creme, pomada, gel, supositório ou óvulo. Orientação para o preparo. Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v). Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bispaga ou pote, opacos com 30 g), supositório ou óvulo (embalagem com 6 unidades). Indicações: hemorróidas, cicatrizante de feridas, leucorréias e contusões. Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia. Aplicar o supositório ou óvulo uma vez ao dia. Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade aos componentes da fórmula. REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2. São Paulo: Robe Editorial, 2003. CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003.</p>	<p>Monografia excluída.</p>	<p>() Incluído (x) Excluído () Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 95 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Cyrtopodium punctatum TM</p>	<p>Monografia excluída.</p>	<p>() Incluído</p>

<p>Nome Homeopático: Cyrtopodium punctatum.. Sinonímia Homeopática: Cyrtopodium speciosissimum.. Forma Farmacêutica para Dispensação: creme, pomada ou gel. Orientação para o preparo. Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v). Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30 g). Indicações: Abscessos e furúnculos. Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia. Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Não usar com a pele escoriada.</p> <p style="text-align: center;">REFERÊNCIAS</p> <p>CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria Editora, 2000.</p>		<p>(x) Excluído () Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 96 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>
<p>Hamamelis virginiana TM Nome Homeopático: Hamamelis virginiana.. Sinonímia Homeopática: Hamamelis androgyna; Hamamelis coroliniana; Hamamelis coryfolia; Hamamelis dentata; Hamamelis dioica; Hamamelis hyemalis; Hamamelis macrophylla; Hamamelis nigra; Hamamelis parvifolia; Hamamelis riparia; Hamamelis rotundifolia; Hamamelis virginica; Trilopus rotundifolia e Trilopus virginica. Forma Farmacêutica para Dispensação: Creme, pomada, gel, supositório e óvulo. Orientação para o preparo. Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v). Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30 g), supositório ou óvulo (embalagem com 6 unidades) Indicações: feridas, afecções cutâneas, hemorroidas e varizes. Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia. Aplicar o supositório ou óvulo uma vez ao dia Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade aos componentes da fórmula.</p> <p style="text-align: center;">REFERÊNCIAS</p> <p>BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003. CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003.</p>	<p>Monografia excluída.</p>	<p>() Incluído (x) Excluído () Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
<p>Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.</p>		
<p>CONTRIBUIÇÃO Nº 97 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)</p>		
<p>Texto submetido à consulta pública</p>	<p>Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)</p>	<p>Síntese da análise das contribuições</p>

		contribuições
Lappa major TM	Monografia excluída.	() Incluído (x) Excluído () Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição
<p>Nome Homeopático: Lappa major. Sinonímia Homeopática. Arctium majus; Arctium lappa; Arctium bardana; Bardana; Lappa minor e Lappa tomentosa. Forma Farmacêutica para Dispensação: Creme, pomada ou gel. Orientação para o preparo. Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v). Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30 g). Indicações: afecções inflamatórias de pele. Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia. Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade aos componentes da fórmula. REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003. CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria Editora, 2000. VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003.</p>		
<p>Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.</p>		
CONTRIBUIÇÃO Nº 98 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Ledum palustre TM	Monografia excluída.	() Incluído (x) Excluído () Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição
<p>Nome Homeopático: Ledum palustre. Sinonímia Homeopática: Ledum decumbens; Ledum dilatatum; Ledum graveolens e Ledum tomentosum. Forma Farmacêutica para Dispensação: Creme, pomada ou gel. Orientação para o preparo. Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v). Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30 g). Indicações: picadas de insetos. Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia. Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade aos componentes da fórmula. REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003. CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. DEMARQUE, D. <i>et al.</i> Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009. HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003. SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria Editora, 2000.</p>		

LATHOUD, F. Estudos de Matéria Médica Homeopática . 2. ed. São Paulo: Organon, 2004.		
Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 99 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Chamomilla TM</p> <p>Nome Homeopático: Matricaria chamomilla. Sinónímia Homeopática: Chamomilla vulgaris e Anthemis vulgaris. Forma Farmacêutica para Dispensação: creme, pomada ou gel. Orientação para o preparo. Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v). Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30 g). Indicações: afecções da pele. Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada, ou gel três vezes ao dia. Advertências gerais: suspender, imediatamente, o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade aos componentes da fórmula. REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003. CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003.</p>	<p>Monografia excluída.</p>	<p>() Incluído (x) Excluído () Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>
Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 100 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Paeonia officinalis TM</p> <p>Nome Homeopático: Paeonia officinalis. Sinónímia Homeopática: Paeonia; Peonia; Paeonia peregrina e Rosa benedicta. Forma Farmacêutica para Dispensação: creme, pomada, gel ou supositório. Orientação para o preparo. Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v). Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30 g), supositório (embalagem com 6 unidades). Indicações: hemorroidas e fissuras anais. Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia. Aplicar o supositório uma vez ao dia. Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade aos componentes da fórmula. REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2 . São Paulo: Robe Editorial, 2003. CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003.</p>	<p>Monografia excluída.</p>	<p>() Incluído (x) Excluído () Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>

Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.

CONTRIBUIÇÃO Nº 101 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)

Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Ratanhia TM Nome Homeopático: Rathania TM. Sinonímia Homeopática: Krameria triandra e Krameria canescens. Forma Farmacêutica para Dispensação: Creme, pomada, gel ou supositório. Orientação para o preparo. Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v). Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bispaga ou pote opacos com 30 g), supositório (embalagem com 6 unidades). Indicações: hemorróidas e fissuras anais. Fissuras dos mamilos nas mulheres lactantes. Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia. Aplicar o supositório uma vez ao dia. Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade aos componentes da fórmula. REFERÊNCIAS ALLEN, H. C. Sintomas-Chave da Matéria Médica Homeopática. 2. ed. São Paulo: Dynamis editorial, 2000. BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática. v. 2. São Paulo: Robe Editorial, 2003. CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática. 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. DEMARQUE, D. <i>et al.</i> Farmacologia & Matéria Médica Homeopática. São Paulo: Organon, 2009. HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia. São Paulo: Andrei, 2003. SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos. São Paulo: Santos Livraria Editora, 2000. VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática. v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003.</p>	<p>Monografia excluída.</p>	<p>() Incluído (x) Excluído () Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>

Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.

CONTRIBUIÇÃO Nº 102 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)

Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
<p>Symphytum officinale TM Nome homeopático: Symphytum officinale. Sinonímia homeopática: Symphytum e Consolida majoris Forma Farmacêutica para Dispensação: creme, pomada ou gel. Orientação para o preparo. Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v). Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bispaga ou pote, opacos com 30 g), supositório (embalagem com 6 unidades). Indicações: traumatismos, cicatrizante e anti-inflamatório. Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia. Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade</p>	<p>Monografia excluída.</p>	<p>() Incluído (x) Excluído () Nova Redação () Nenhuma contribuição incorporada () Sem contribuição</p>

aos componentes da fórmula. Não usar com a pele escoriada.		
REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática . v. 2. São Paulo: Robe Editorial, 2003. CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática . 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. DEMARQUE, D. <i>et al.</i> Farmacologia & Matéria Médica Homeopática . São Paulo: Organon, 2009. HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia . São Paulo: Andrei, 2003. SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos . São Paulo: Santos Livraria Editora, 2000. VANNIER, L.; POIRIER, J. Matéria Médica Homeopática . México: Porrua, 1979.		
Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.		
CONTRIBUIÇÃO Nº 103 (MAIORES ESCLARECIMENTOS VIDE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES – ANEXO II)		
Texto submetido à consulta pública	Texto final consolidado (inclusão, exclusão, nova redação ou sem alteração)	Síntese da análise das contribuições
Thuya occidentalis TM Nome Homeopático: Thuya occidentalis. Sinonímia Homeopática: Thuya e Arbor vitae. Forma Farmacêutica para Dispensação: Creme, pomada, gel ou óvulo. Orientação para o preparo. Preparar o insumo ativo conforme Farmacopeia Homeopática Brasileira em vigor e incorporá-lo ao insumo inerte na proporção de 10% (p/v) ou (v/v). Quantidade sugerida para dispensação: creme, pomada ou gel (bisnaga ou pote, opacos com 30 g), óvulo (embalagem com 6 unidades). Indicações: verrugas, condilomas, pólipos, úlceras e fístulas. Posologia sugerida: aplicar o creme, pomada ou gel três vezes ao dia. Aplicar o óvulo uma vez ao dia. Advertências gerais: suspender imediatamente o uso, se o paciente apresentar hipersensibilidade aos componentes da fórmula. REFERÊNCIAS BOERICKE, W. Manual de Matéria Médica Homeopática . v. 2. São Paulo: Robe Editorial, 2003. CAIRO, N. Guia de Medicina Homeopática . 21. ed. São Paulo: Livraria Teixeira, 1991. DEMARQUE, D. <i>et al.</i> Farmacologia & Matéria Médica Homeopática . São Paulo: Organon, 2009. HORVILLEUR, A. Vade-mécum da Prescrição em Homeopatia . São Paulo: Andrei, 2003. SOARES, A. A. D. Dicionário de medicamentos homeopáticos . São Paulo: Santos Livraria Editora, 2000. TETAU, M. Matière Médicale Homéopathique Clinique et Associations Biothérapeutiques . Tome I, II. Paris: Maloine, 1983. VANNIER, L.; POIRIER, J. Précis de matière médicale homéopathique . Paris: Doin, 1985. VIJNOVSKY, B. Tratado de Matéria Médica Homeopática . v. 1, 2 e 3. São Paulo: Organon, 2003. VOISIN, H. Manual de Matéria Médica para o Clínico . 2. ed. São Paulo: Andrei, 1984.	Monografia excluída.	<input type="checkbox"/> Incluído <input checked="" type="checkbox"/> Excluído <input type="checkbox"/> Nova Redação <input type="checkbox"/> Nenhuma contribuição incorporada <input type="checkbox"/> Sem contribuição
Justificativa: após reavaliação da monografia o Conselho Deliberativo da Farmacopeia Brasileira decidiu pela sua exclusão, em razão da Resolução RDC nº 26, de 30 de março de 2007 não prever o uso de tintura-mãe em medicamentos homeopáticos.		

É o Relatório que submetemos à consideração superior.

Brasília, __/__/__

Riviane Matos Gonçalves
Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária
Coordenação da Farmacopeia - COFAR/GGMED

Brasília, __/__/__

Varley Dias Sousa
Coordenador
Coordenação da Farmacopeia - COFAR/GGMED

De acordo. Ao Gerente Geral para conhecimento e demais providências.

Brasília, __/__/__

De acordo. Encaminhe-se o presente Relatório ao Diretor Relator.

Patricia Ferrari Andreotti
Gerente-Geral
Gerência-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos – GGMED

ANEXO I - RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA CONSULTA PÚBLICA, EM ORDEM ALFABÉTICA

N.º	Nome
1	Adriana Passos Oliveira
2	Adriano Rostirolla Linhares
3	Alexander Jorge Saliba
4	Alexandre Machado Lopes
5	Aline Carolina dos Santos Batista
6	Amarilys de Toledo Cesar
7	Ana Christina Passos
8	Ana Lucia de Lima Costa
9	Ana Maria Pereira Garcia
10	Andresa Aparecida Souza de Oliveira
11	Antonio C. B. Martins
12	Arion Denisar Olsen
13	Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas
14	Bertrand da Silva
15	Bruna Sirtori
16	Célia Maria Carneiro dos Santos
17	Celso Luiz Viola
18	Cilene Patti Silveira
19	Cíntia Abruzzini
20	Claudete Barbosa da Silva Penha
21	Cleonice Schwade
22	Cristina Aparecida Bonvechio Binotto
23	Daniel Udenir Beckner
24	Debora Fernandes Luiz Lopes
25	Denise Sisti Peres Bendhack
26	Diolanda Fiorati Garcia
27	Dione Soares da Cunha
28	Edson da Silva Gomes
29	Edson Salviano Campos
30	Elaine Cristina Coleho Baptista
31	Eliete M. M. Fagundes
32	Elisa Maciel Costa
33	Elza Helena Guimarães Lara

34	Enos Santana
35	Evandro Aguiar Nascimento
36	Fábio Eduardo Celant
37	Fábio Galvão
38	Fabiola Angelita Cezarina Bastos Martins
39	Fernando Gozzo Costa Soares
40	Flavio Ernesto Milanese
41	Françoise Rosa Silva
42	Gelson Garcia de Carvalho
43	Geraldo Soares da Silva
44	Gerson Eustaquio B. Oliveira
45	Gilberto Ribeiro Vieira
46	Gilda Marilsa Dias Reis
47	Janaíne Ramos Martins
48	Javier Salvador Gamarra Junior
49	João Marcio Berto
50	Jose Alberto Moreno
51	José Lidonês Alexandre Borges
52	Jose Osmildo Viana
53	José Tavares dos Santos
54	Julio Cezar Benedito
55	Karen Denez (Coordenadora GT de Homeopatia CFF)
56	Kleiber Gama
57	Leonir Antônia Casarim
58	Luís Gustavo Gomes da Costa
59	Mafalda Biagini
60	Magda Vieira
61	Marcelaine Silva Macedo
62	Márcia Cristina Alvarenga
63	Márcia de Cássia Silva Borges
64	Marco Antônio Fiaschetti
65	Marcos Valério Lacerda
66	Marcus Zulian Teixeira
67	Maria Aparecida Moreira Carmona



68	Maria Aparecida Paixao
69	Maria Cecília M. S. Proença
70	Maria Clarindo Carvalho
71	Maria Conceição Moraes Pereira
72	Maria Eduarda Garcia Couto de Azevedo
73	Maria Helena Rossi
74	Maria Regina Meneghello Valdo
75	Mariceli Campos
76	Marilene Goebel
77	Marilisa Guimarães Lara
78	Marina Sayuri Mizutani Hashimoto
79	Mario Sergio Giorgi
80	Marisol Almeida Ferreira Rodrigues
81	Matheus Marim
82	Mércia de Fátima Alves Souza
83	Moacir Wilson de Sá Ferreira
84	Monica Proença Simão
85	Naiara Vívía Souza Alves
86	Nanci Cristina do Amaral Santos
87	Olney Leite Fontes
88	Oswaldo Antonio Passos Teixeira Dantas

89	Paulo Cezar Maldonado
90	Pedro Alves dos Santos
91	Pedro Eduardo Menegasso
92	Rejane Alves Gue Hoffmann
93	Renato Nascimento
94	Rita Maria Welter Umann
95	Rodrigo Alves Soares Cruz
96	Rodrigo Garcez
97	Rosa Maria Clementino
98	Rosana Mara Ceribelli Nechar
99	Rosana Maria Figueiredo
100	Rosana Mastellaro
101	Rosangela Oliveira Mendes
102	Rudinelli Henrique Souza e Barbosa
103	Sabrina Coppola Germanos
104	Sandra Abrahão Chaim Salles
105	Sheila Winckler Simões da Silva
106	Sônia Silva Ramirez
107	Ubiratan Cardinalli Adler
108	Valéria Reis
109	Virginia Maria Ferreira Rodrigues

ANEXO II – ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DAS CONTRIBUIÇÕES

A planilha com as contribuições recebidas, contemplando o posicionamento e justificativa técnica do Comitê Técnico Temático de Homeopatia da Farmacopeia Brasileira está disposta em arquivo de Excel em anexo.