

ÍNDICE MONOGRAFICO	NOME
C55	COMPOSTOS A BASE DE COBRE

C55 - Compostos a Base de Cobre

C55.1 – Hidróxido de Cobre

a) Ingrediente ativo ou nome comum: HIDRÓXIDO DE COBRE (copper hydroxide)


b) Sinonímia: Hidróxido de cobre(II); Hidróxido cúprico; Dihidróxido de cobre

c) N° CAS: 20427-59-2

d) Nome químico: cupric hydroxide ou copper(II) hydroxide

e) Fórmula bruta: $\text{Cu}(\text{OH})_2$

f) Fórmula estrutural:



g) Grupo químico: Inorgânico

h) Classe: Fungicida e bactericida

i) Emprego domissanitário: autorizado conforme indicado.

1. Modalidade de Emprego, tipo de formulação e concentração de limites máximos autorizados:

1.2 Jardinagem Amadora

Tipo de formulação	Concentração
Suspensão Pronto Uso	0,28 % p/p

C55.2 – Oxiclureto de cobre

a) Ingrediente ativo ou nome comum: OXICLORETO DE COBRE (copper oxychloride)


b) Sinonímia: Cloreto básico de cobre; Cloreto cúprico básico; Oxiclureto cúprico básico

c) N° CAS: 1332-40-7

d) Nome químico: dicopper chloride trihydroxide

e) Fórmula bruta: $\text{Cu}_2\text{Cl}(\text{OH})_3$

f) Fórmula estrutural:



g) Grupo químico: Inorgânico

h) Classe: Fungicida e bactericida

C55.3 – Óxido cuproso

a) Ingrediente ativo ou nome comum: ÓXIDO CUPROSO (cuprous oxide)


b) Sinonímia: Óxido de cobre(I); C.I. 77402

c) N° CAS: 1317-39-1

d) Nome químico: copper(I) oxide

e) Fórmula bruta: Cu_2O

f) Fórmula estrutural:



g) Grupo químico: Inorgânico

h) Classe: Fungicida e bactericida

C55.4 – Sulfato de cobre

a) Ingrediente ativo ou nome comum: SULFATO DE COBRE (copper sulfate)


b) Sinonímia: Sulfato de cobre(II); Sulfato cúprico; Monossulfato de cobre

c) N° CAS: 7758-98-7

d) Nome químico: cupric sulfate ou copper(II) tetraoxosulfate

e) Fórmula bruta: CuSO_4

f) Fórmula estrutural:



g) Grupo químico: Inorgânico

h) Classe: Fungicida e bactericida

C55.5 – Oxina-cobre

a) Ingrediente ativo ou nome comum: OXINA-COBRE (oxine-copper)


b) Sinonímia: Quinolinolato de cobre 8; Cobre-8-quinolinolato; Cobre-8-quinolinol; Quinolato de cobre 8; Quinolato de cobre; Oxiquinolato de cobre.

c) N° CAS: 10380-28-6

d) Nome químico: bis(quinolin-8-olato-*O,M*)copper ou cupric 8-quinolinoxide

e) Fórmula bruta: $C_{18}H_{12}CuN_2O_2$

f) Fórmula estrutural:



g) Grupo químico: Organocúprico

h) Classe: Fungicida

i) Classificação toxicológica: específica para cada produto, conforme art. 38 da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 294, de 29 de julho de 2019.

j) Uso como Preservante de Madeira - Uso exclusivo para tratamento de madeiras destinadas para dormentes, postes, cruzetas, mourões para cercas rurais, esteios e vigas, com a finalidade de registro no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

C55.6 – Carbonato básico de cobre

a) Ingrediente ativo ou nome comum: CARBONATO BÁSICO DE COBRE (basic copper carbonate)


b) Sinonímia: Carbonato cúprico básico; Hidroxicarbonato de cobre; Carbonato básico de cobre(II)

c) N° CAS: 12069-69-1

d) Nome químico: copper(II) hydroxide carbonate ou basic copper carbonate

e) Fórmula bruta: $Cu_2(OH)_2CO_3$ ou $CuCO_3.Cu(OH)_2$

f) Fórmula estrutural:



g) Grupo químico: inorgânico

h) Classe: Fungicida

i) Classificação toxicológica: específica para cada produto, conforme art. 38 da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 294, de 29 de julho de 2019.

Uso como Preservante de Madeira - Uso exclusivo para tratamento de madeiras destinadas para dormentes, postes, cruzetas, mourões para cercas rurais, esteios e vigas, com a finalidade de registro no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

- Informações comuns: hidróxido de cobre, oxiclreto de cobre, óxido cuproso e sulfato de cobre

a) Uso agrícola: autorizado conforme indicado.

Modalidade de emprego:

Aplicação foliar nas culturas de abacate, **abacaxi**, abóbora, abobrinha, **açaí**, **acerola**, agrião, aipo, alface, algodão, alho, alho-poró, almeirão, ameixa, amendoim, amora, **anonáceas**, **azeitona**, banana, batata, **batata-doce**, **batata-yacon**, berinjela, beterraba, brócolis, cacau, café, caju, caqui, **cará**, **carambola**, **castanha-do-pará**, cebola, cebolinha, cenoura, chá, **chalota**, chicória, **chuchu**, citros, coco, couve, couve-flor, crisântemo, **cupuaçu**, cravo, dália, ervilha, espinafre, feijão, feijão-vagem, figo, **framboesa**, fumo, **gengibre**, goiaba, **guaraná**, **inhame**, jiló, **kiwi**, **macadâmia**, maçã, mamão, **mandioca**, **mandioquinha-salsa**, manga, **mangaba**, maracujá, marmelo, **maxixe**, melancia, melão, **mirtilo**, morango, nabo, nectarina, nêspera, noz pecan, orquídeas, **ornamentais**, pepino, pêra, pêssego, pimenta, pimenta-do-reino, pimentão, **pitanga**, **pupunha**, quiabo, **rabanete**, repolho, **romã**, rosa, **seriguela**, seringueira, soja, tomate, trigo e uva.

Aplicação no sulco de plantio na cultura de cana-de-açúcar.

Culturas	Modalidade de Emprego (Aplicação)	LMR (mg/kg)	Intervalo de Segurança
Abacate	Foliar	(1)	
Abacaxi	Foliar	(1)	
Abóbora	Foliar	(1)	
Abobrinha	Foliar	(1)	
Açaí	Foliar	(1)	
Acerola	Foliar	(1)	
Agrião	Foliar	(1)	
Aipo	Foliar	(1)	
Alface	Foliar	(1)	
Algodão	Foliar	(1)	
Alho	Foliar	(1)	
Almeirão	Foliar	(1)	
Ameixa	Foliar	(1)	
Amendoim	Foliar	(1)	
Amora	Foliar	(1)	
Anonáceas	Foliar	(1)	
Azeitona	Foliar	(1)	
Banana	Foliar	(1)	
Batata	Foliar	(1)	
Batata-doce	Foliar	(1)	
Batata-yacon	Foliar	(1)	
Berinjela	Foliar	(1)	
Beterraba	Foliar	(1)	
Brócolis	Foliar	(1)	
Cacau	Foliar	(1)	
Café	Foliar	(1)	
Caju	Foliar	(1)	
Cana-de-açúcar	Sulco de plantio	(1)	
Caqui	Foliar	(1)	
Cará	Foliar	(1)	
Carambola	Foliar	(1)	
Castanha-do-Pará	Foliar	(1)	

Cebola	Foliar	(1)
Cebolinha	Foliar	(1)
Cenoura	Foliar	(1)
Chá	Foliar	(1)
Chalota	Foliar	(1)
Chicória	Foliar	(1)
Chuchu	Foliar	(1)
Citros	Foliar	(1)
Coco	Foliar	(1)
Couve	Foliar	(1)
Couve-flor	Foliar	(1)
Cravo	Foliar	UNA
Crisântemo	Foliar	UNA
Cupuaçu	Foliar	(1)
Dália	Foliar	UNA
Ervilha	Foliar	(1)
Espinafre	Foliar	(1)
Feijão	Foliar	(1)
Feijão-vagem	Foliar	(1)
Figo	Foliar	(1)
Framboesa	Foliar	(1)
Fumo	Foliar	UNA
Gengibre	Foliar	(1)
Goiaba	Foliar	(1)
Guaraná	Foliar	(1)
Inhame	Foliar	(1)
Jiló	Foliar	(1)
Kiwi	Foliar	(1)
Macadâmia	Foliar	(1)
Maçã	Foliar	(1)
Mamão	Foliar	(1)
Mandioca	Foliar	(1)
Mandioquinha-salsa	Foliar	(1)
Manga	Foliar	(1)
Mangaba	Foliar	(1)
Maracujá	Foliar	(1)
Marmelo	Foliar	(1)
Maxixe	Foliar	(1)
Melancia	Foliar	(1)
Melão	Foliar	(1)
Mirtilo	Foliar	(1)
Morango	Foliar	(1)
Nabo	Foliar	(1)
Nectarina	Foliar	(1)
Nêspera	Foliar	(1)
Noz Pecã	Foliar	(1)
Orquídeas	Foliar	UNA
Ornamentais	Foliar	UNA
Pepino	Foliar	(1)
Pêra	Foliar	(1)
Pêssego	Foliar	(1)
Pimenta	Foliar	(1)
Pimenta-do-reino	Foliar	(1)
Pimentão	Foliar	(1)

Pitanga	Foliar	(1)
Pupunha	Foliar	(1)
Quiabo	Foliar	(1)
Rabanete	Foliar	(1)
Repolho	Foliar	(1)
Romã	Foliar	(1)
Rosa	Foliar	UNA
Seriguela	Foliar	(1)
Seringueira	Foliar	UNA
Soja	Foliar	(1)
Tomate	Foliar	(1)
Trigo	Foliar	(1)
Uva	Foliar	(1)

(1) Os níveis máximos de cobre devem obedecer à legislação específica para contaminantes em alimentos “in natura”, quando aplicável. Intervalo de segurança: sem restrições

UNA = Uso Não Alimentar

b) Classificação toxicológica: específica para cada produto, conforme art. 38 da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 294, de 29 de julho de 2019.

Resolução RE nº 1.389 de 28/03/12 (DOU de 29/03/12)

Resolução RE nº 3.106 de 12/11/15 (DOU de 13/11/15)

Resolução RE nº 2.088 de 03/08/16 (DOU de 08/08/16)

Resolução RE nº 2.475 de 15/09/16 (DOU de 19/09/16)

Resolução RE nº 303, de 30/01/2020 (DOU de 03/02/2020)