

ÍNDICE MONOGRAFICO	NOME
F65	FLUOPICOLIDA

F65 - Fluopicolida

a) Ingrediente ativo ou nome comum: FLUOPICOLIDA (fluopicolide)


b) Sinonímia: -

c) N° CAS: 239110-15-7

d) Nome químico: 2,6-dichloro-N-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl]benzamide

e) Fórmula bruta: C₁₄H₈Cl₃F₃N₂O

f) Fórmula estrutural:



g) Grupo químico: Benzamida piridina

h) Classe: fungicida

i) Classificação toxicológica: Classe III

j) Uso agrícola: autorizado conforme indicado

Modalidade de emprego: aplicação foliar nas culturas de abóbora, abobrinha, alface, almeirão, batata, berinjela, brócolis, cebola, chicória, chuchu, couve, couve-chinesa, couve-flor, fumo, jiló, mamão, melancia, melão, pepino, pimenta, pimentão, quiabo, repolho, rosa, tomate e uva.

Culturas	Modalidade de Emprego (Aplicação)	LMR (mg/kg)	Intervalo de Segurança
Abóbora ¹	Foliar	0,2	1 dia
Abobrinha ¹	Foliar	0,2	1 dia
Alface	Foliar	3,0	3 dias
Almeirão ¹	Foliar	3,0	3 dias
Alface	Foliar	3,0	3 dias
Batata	Foliar	0,07	14 dias
Berinjela ¹	Foliar	0,2	1 dia
Brócolis ¹	Foliar	0,7	1 dia
Cebola	Foliar	0,05	14 dias
Chicória ¹	Foliar	3,0	3 dias
Chuchu ¹	Foliar	0,2	1 dia
Couve ¹	Foliar	0,7	1 dia
Couve-chinesa ¹	Foliar	0,7	1 dia
Couve-flor ¹	Foliar	0,7	1 dia
Fumo	Foliar	UNA	

Jiló ¹	Foliar	0,2	1 dia
Mamão	Foliar	0,5	7 dias
Melancia	Foliar	0,2	7 dias
Melão	Foliar	0,2	7 dias
Pepino	Foliar	0,2	1 dia
Pimenta ¹	Foliar	0,2	1 dia
Pimentão	Foliar	0,2	1 dia
Quiabo ¹	Foliar	0,2	1 dia
Repolho	Foliar	0,7	1 dia
Rosa	Foliar	UNA	
Tomate	Foliar	0,1	7 dias
Uva	Foliar	0,5	7 dias

UNA = Uso Não Alimentar

¹ Inclusões de culturas solicitadas conforme Instrução Normativa Conjunta - INC nº 001/2014.

Obs: Os LMRs referem-se à soma de fluopicolida e seus metabólitos: 2,6-dichlorobenzamide (CAS: 2008-58-4) e 3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid (CAS: 80194-68-9).

k) Ingestão Diária Aceitável (IDA) = 0,08 mg/kg p.c.

Resolução RE nº 3.486 de 24/09/08 (DOU de 25/09/08)

Resolução RE nº 341 de 04/02/15 (DOU de 05/02/15)